



Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Direttore: Sergio Segato

PREPARAZIONE INTESTINALE PER ESECUZIONE DI COLONSCOPIA

La buona pulizia dell'intestino è un fattore molto importante perché la colonscopia risulti efficace ed affidabile. Se la pulizia non è adeguata, il rischio di non rilevare polipi o altre lesioni risulta più elevato.

Il giorno precedente l'esame va assunta una dieta senza scorie (NO frutta, verdura, legumi, alimenti integrali) .



PREPARAZIONE ADEGUATA



PREPARAZIONE INADEGUATA

La preparazione prevede l'utilizzo di **uno solo** dei preparati sotto riportati ; le preparazioni proposte sono quelle suggerite nelle linee guida Europee sulla preparazione alla colonscopia (Bowel preparation for colonoscopy:European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline-Update 2019) , presentano analoga efficacia e differiscono principalmente per la quantità di prodotto da assumere.

1. PLENVU

Preparare il prodotto aggiungendo ½ litro di acqua alla bustina “ Dose 1” e mescolare fino a che la polvere sia completamente sciolta; versare il contenuto della bustina A e della Bustina B della “Dose 2 “ in ½ litro di acqua e mescolare fino a che la polvere sia completamente sciolta. Non invertire la sequenza delle dosi.

Il ciclo di trattamento deve essere assunto:

ESAME PROGRAMMATO PRIMA DELLE 10 : dose 1 alle ore 14 e dose 2 alle ore 20 del giorno precedente .Bere almeno ½ litro di acqua o liquidi chiari nei 30 minuti successivi all'assunzione delle dosi ed ulteriori liquidi se avete sete.

ESAME PROGRAMMATO DOPO LE 10 Dose 1 alle ore 20 del giorno precedente e dose 2 alle ore 6 del mattino dell'esame .Bere almeno ½ litro di acqua o liquidi chiari nei 30 minuti successivi all'assunzione delle dosi ed ulteriori liquidi se avete sete.

ESAME PROGRAMMATO DOPO LE 14 : Dose 1 alle ore 7 e dose 2 alle ore 10 del mattino dell'esame .Bere almeno ½ litro di acqua o liquidi chiari nei 30 minuti successivi all'assunzione delle dosi ed ulteriori liquidi se avete sete.

Dall'inizio del ciclo di trattamento e fino al termine dell'esame clinico non deve essere assunto alcun cibo solido. L'apporto di liquidi chiari è libero fino a due ore prima dell'esecuzione dell'esame

Attenzione ! Plenvu è controindicato nei pazienti affetti da favismo e da fenilchetonuria

Oppure :

2. MOVIPREP/CLENSIA

Un ciclo di trattamento comporta l'assunzione di due litri di soluzione ognuno costituito da una "Bustina A" e da una "Bustina B" (due bustine A + due bustine B nel caso di Clensia) sciolte in un litro di acqua. La soluzione ricostituita deve essere bevuta nell'arco di una o due ore.

Il ciclo di trattamento deve essere assunto:

ESAME PROGRAMMATO PRIMA DELLE 10 : un litro di soluzione alle ore 14 e un litro alle 20 del giorno prima dell'esame

ESAME PROGRAMMATO DOPO LE 10: un litro di soluzione alle ore 20 della sera precedente e un litro alle 6 del mattino del giorno dell'esame

ESAME PROGRAMMATO DOPO LE 14 : un litro di soluzione alle ore 7 ed un litro alle ore 10 del giorno dell'esame

Dall'inizio del ciclo di trattamento e fino al termine dell'esame clinico non deve essere assunto alcun cibo solido. Nel corso della preparazione è raccomandata l'assunzione anche di un litro di liquido chiaro (acqua, brodo, succo di frutta senza polpa, bevande analcoliche, tè senza latte) e di ulteriori liquidi se avete sete.

Attenzione ! Moviprep è controindicato nei pazienti affetti da favismo e da fenilchetonuria

Oppure:

3. LOVOL-ESSE e LOVOLDYL

La scatola di LOVOL-ESSE contiene 4 buste. Ogni busta deve essere sciolta in 500 ml di acqua naturale. La preparazione totale è di 2 litri di soluzione. La scatola di LOVOLDYL contiene 4 compresse. Ogni litro di preparazione (2 buste) deve essere bevuto nell'arco di 1 ora circa

Il ciclo di trattamento deve essere assunto:

ESAME PROGRAMMATO PRIMA DELLE 10 : Il giorno prima dell'esame 3 compresse di LOVOLDYL alle ore 15.00. Alle ore 18.00 un litro di soluzione .Ore 21.00 un litro di soluzione

ESAME PROGRAMMATO DOPO LE 10: Il giorno prima dell'esame 3 compresse di LOVOLDYL alle ore 15.00. Alle ore 18.00 un litro di soluzione . Il giorno dell'esame alle ore 6,00 un litro di soluzione.

ESAME PROGRAMMATO DOPO LE 14:Il giorno prima dell'esame 3 compresse di LOVOLDYL alle ore 15,00. Alle ore 18.00 un litro di soluzione. Il giorno dell'esame alle ore 9.00 un litro di soluzione.

Dall'inizio del ciclo di trattamento e fino al termine dell'esame clinico non deve essere assunto alcun cibo solido. Nel corso della preparazione è raccomandata l'assunzione anche di un litro di liquido chiaro (acqua, brodo, succo di frutta senza polpa, bevande analcoliche, tè senza latte) e di ulteriori liquidi se avete sete.

Oppure :

4. PICOPREP e CITRAFLEET

Ricostituire il contenuto di una bustina in una tazza di acqua (circa 150 ml). Mescolare per 2-3 minuti per formare una soluzione biancastra, opaca con un lieve odore di arancia. Se diventa calda, attendere finchè raggiunge una temperatura adeguata per essere bevuta.

Il ciclo di trattamento deve essere assunto:

ESAME PROGRAMMATO PRIMA DELLE 10 : Una bustina ricostituita in acqua secondo le istruzioni alle ore 14 e 1 bustina alle ore 20 del giorno precedente .Bere almeno 1 litro di liquidi chiari nelle 2 ore successive all'assunzione della dose ed ulteriori liquidi se avete sete.

ESAME PROGRAMMATO DOPO LE 10 Una bustina ricostituita in acqua secondo le istruzioni alle ore 20 del giorno precedente e 1 bustina alle ore 6 del mattino dell'esame . Bere almeno 1 litro di liquidi chiari nelle 2 ore successive all'assunzione della dose ed ulteriori liquidi se avete sete.

ESAME PROGRAMMATO DOPO LE 14 : Una bustina ricostituita in acqua secondo le istruzioni alle ore 7 e 1 bustina alle ore 10 del mattino dell'esame Bere almeno 1 litro di liquidi chiari nelle 2 ore successive all'assunzione della dose ed ulteriori liquidi se avete sete.

Attenzione ! Dall'inizio di ogni tipo di preparazione intestinale e fino al termine dell'esame clinico non deve essere assunto alcun cibo solido. L'apporto di liquidi chiari è libero fino a due ore prima dell'esecuzione dell'esame

Vi invitiamo comunque a leggere il foglietto illustrativo dei farmaci consigliati ; se avete qualche dubbio non esitate a contattare la segreteria dell'Endoscopia Digestiva al 0332 278382 negli orari di ufficio.