

**AZIENDA SOCIO
SANITARIA
DEI SETTE LAGHI**

**COLLABORATORE
PROFESSIONALE
SANITARIO
OSTETRICA, CAT. D**

QUESTIONARIO 2

*Michele
Bertolotto*

001. I livelli di estrogeni e progesterone sono entrambi elevati durante:

- A) La fase luteale.
- B) La fase follicolare precoce.
- C) La fase follicolare media.
- D) La fase mestruale.

002. L'imene è una membrana mucosa costituita da:

- A) Connettivo ed epitelio.
- B) Solo epitelio.
- C) Solo connettivo.
- D) Tessuto ghiandolare.

003. Cosa sono i movimenti di nutazione e contronutazione?

- A) Movimenti della pelvi che permettono un cambiamento di dimensione e forma della stessa.
- B) Fenomeni di modificazione dei tessuti vaginali.
- C) Modalità di rotazione del bacino in senso orario e antiorario.
- D) Fenomeni plastici messi in atto dal feto durante il passaggio nel canale del parto.

004. Il partogramma è:

- A) Uno strumento di registrazione grafica dell'andamento del travaglio.
- B) Uno strumento per registrare il battito cardiaco fetale.
- C) Uno strumento per registrare i parametri materni.
- D) Uno strumento di verifica del benessere fetale.

005. Nella presentazione cefalica di fronte la testa è:

- A) Semi deflessa.
- B) Completamente flessa.
- C) Non deflessa.
- D) Completamente deflessa.

006. La raccomandazione ministeriale n°16 si riferisce a:

- A) Prevenzione della morte o disabilità permanente di un neonato di peso >2500gr non correlata a malattia congenita.
- B) Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori di somministrazione di terapia farmacologica.
- C) Prevenzione della morte materna correlata ai travagli e/o parto.
- D) Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0.

007. Il profilo professionale dell'Ostetrica/o è stato declinato nel:

- A) DM 740/1994.
- B) DM 739/1994.
- C) DM 741/1994.
- D) DM 742/1994.

008. La prima manovra di Leopold permette di stabilire:

- A) Il livello raggiunto dal fondo uterino.
- B) Il grado di discesa della parte presentata.
- C) La parte presentata.
- D) Se il feto è in situazione longitudinale.

009. A cosa si riferisce la seguente definizione? *"media della F.C.F., considerando un possibile incremento di 5 battiti, in un periodo di 10 minuti escludendo accelerazioni e decelerazioni e periodi di marcata variabilità > 25 bpm"*.

- A) Linea di base.
- B) Variabilità della frequenza cardiaca fetale.
- C) Tracciato sinusoidale.
- D) Variazioni della linea di base.

010. In gravidanza la concentrazione di fibrinogeno nel sangue materno:

- A) Aumenta.
- B) Diminuisce.
- C) Rimane invariata.
- D) Va controllata mensilmente.

011. Il calibro dei cateteri vescicali viene, generalmente, misurato in:

- A) Charrier.
- B) Nelaton.
- C) Gauge.
- D) Foley.

012. Per D.P.I. si intende:

- A) Dispositivo protezione individuale.
- B) Dispositivo personale igienico.
- C) Dispositivo prevenzione individuale.
- D) Deterrente per infezioni.

013. Un individuo si definisce obeso quando l'Indice di Massa Corporea è:

- A) >30.
- B) >15 <20.
- C) >20 <25.
- D) >27 <30.

014. L'episiotomia medio - laterale interessa:

- A) Cute, sottocute, muscolo bulbo- cavernoso, trasverso superficiale del perineo ed elevatore dell'ano.
- B) Cute, sottocute e muscolo trasverso superficiale del perineo.
- C) Cute, sottocute, muscolo bulbo -cavernoso ed elevatore dell'ano.
- D) Cute, muscolo bulbo- cavernoso, trasverso superficiale del perineo ed elevatore dell'ano.

015. Le lacerazioni perineali di II grado interessano:

- A) Muscoli e fasce del perineo ma non lo sfintere dell'ano.
- B) Mucosa vulvo-vaginale e cute perineale.
- C) Sfintere dell'ano ma non la mucosa ano-rettale.
- D) Sfintere e mucosa ano-rettale.

016. Quale tra le seguenti affermazioni è errata:

- A) L'ostetrica può seguire in autonomia la gravidanza patologica.
- B) L'ostetrica è in grado di individuare alterazioni patologiche che richiedono intervento del medico.
- C) L'ostetrica conduce e porta a termine in autonomia parti eutocici.
- D) L'ostetrica presta assistenza al neonato fisiologico.

017. Quali dei seguenti parametri non è valutato nel punteggio di Apgar:

- A) Temperatura corporea.
- B) Frequenza cardiaca.
- C) Tono muscolare.
- D) Colorito cutaneo.

018. Quali sono le 4 cause alla genesi dell'emorragia post-partum (4T)?

- A) Tono, trauma, tessuti, trombina.
- B) Tono, trauma, tessuti, tachicardia.
- C) Tono, trauma, trombina, trazione.
- D) Tono, tachicardia, tessuti, trombina.

019. Si definisce puerperio il periodo compreso tra:

- A) La fine del parto e la ripresa dell'attività ciclica ovarica.
- B) L'espulsione del feto e la ripresa dell'attività ciclica ovarica.
- C) I primi tre mesi dopo il parto.
- D) I primi sei mesi dopo il parto.

020. Qual è uno dei fattori di rischio che può determinare una produzione inadeguata di latte materno?

- A) Chirurgia mammaria.
- B) Diabete gestazionale.
- C) Patologia della coagulazione.
- D) Nessuna delle altre alternative di risposta.

021. Il cordone ombelicale è caratterizzato da:

- A) Due arterie e una vena.
- B) Due vene e due arterie.
- C) Due vene e un'arteria.
- D) Un'arteria e una vena.

022. A quale settimana gestazionale il feto raggiunge la maturità polmonare?

- A) 34 settimane.
- B) 30 settimane.
- C) 32 settimane.
- D) 38 settimane.

023. Non è un fattore di rischio per EPP:

- A) Peso alla nascita < 4000 gr.
- B) Placenta ritenuta.
- C) Gravidanza multipla.
- D) Peso alla nascita > 4000 gr.

024. Il riflesso di spinta all'apice della contrazione si avverte quando la parte presentata si appoggia al muscolo:

- A) Elevatore dell'ano.
- B) Trasverso profondo.
- C) Sacro - coccigeo.
- D) Nessuna delle altre alternative di risposta.

025. Il MEOWS è:

- A) Un sistema di monitoraggio per rilevare precocemente le condizioni di emergenza ostetrica.
- B) Un acronimo utilizzato per la valutazione della poppata.
- C) Un sistema di monitoraggio del neonato patologico.
- D) Nessuna delle altre alternative di risposta.

026. Quali sono i segni clinici di avvenuto distacco placentare?

- A) Tutte le altre alternative di risposta.
- B) Alterazione della forma delle dimensione dell'utero.
- C) Discesa del cordone ombelicale.
- D) Moderata perdita ematica.

027. Cosa s'intende per trattamento attivo del terzo stadio?

- A) Somministrazione di un farmaco utero tonico al disimpegno della spalla.
- B) Somministrazione di un farmaco utero tonico al disimpegno della parte presentata.
- C) Somministrazione di un farmaco miorilassante nel secondo stadio.
- D) Clampaggio tardivo del cordone ombelicale.

028. Quali sono le più frequenti infezioni in puerperio che hanno una maggiore potenzialità di evoluzione verso la sepsi.

- A) Tutte le altre alternative di risposta.
- B) Mastiti, infezione della ferita chirurgica (taglio cesareo), infezione endometriali.
- C) Ascesso pelvico.
- D) Infezioni delle vie urinarie.

029. Temperatura > a 38° dopo le prime 24 ore dal parto che si mantiene tale per oltre 24 ore, quali esami eseguire nelle prime 12-24 ore prima di iniziare la terapia antibiotica?

- A) Emocromo con formula, lattacidemia, PCR, emocolture, procolcitonina.
- B) Glicemia.
- C) TSH.
- D) Test di Coombs indiretto.

030. Con quale norma sono state stabilite in modo strutturato le competenze professionali dell'ostetrica, ed in particolare la competenza a condurre e portare a termine parti eutocici?

- A) Con il D.M.14/09/1994, N° 740.
- B) Con il Codice Deontologico dell'Ostetrica.
- C) Con la legge del 10/08/2000, N° 251.
- D) Con la legge N° 42 del 26/02/1999.