

## Questionario 49005004

- 1. In caso di pneumotorace il drenaggio inserito nella cavità pleurica deve:**
  - A. Essere collegato a un sacchetto di raccolta sterile e a caduta
  - B. Essere collegato a un sistema senza dispositivo a valvola
  - C. Essere collegato a un sistema con dispositivo a valvola d'acqua
  - D. Restare "clampato" per le prime 4-8 ore
- 2. Tutte le seguenti potrebbero essere causa di acidosi respiratoria eccetto:**
  - A. Sedazione
  - B. Iperventilazione
  - C. Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO)
  - D. Trauma cranico
- 3. La scala di Braden valuta ...**
  - A. Il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana
  - B. Il rischio di caduta
  - C. Il rischio di insorgenza di Lesioni da Pressione
  - D. La disabilità successiva a ictus
- 4. In quale delle seguenti condizioni è indicata la manovra di Heimlich?**
  - A. Insufficienza respiratoria
  - B. Caduta posteriore della lingua
  - C. Inalazione di corpo estraneo
  - D. Pneumotorace
- 5. Avendo a disposizione Sodio Bicarbonato fiale da 10 ml con 1 mEq/ml e dovendo disporre di 25 mEq, quante fiale devono essere aspirate?**
  - A. 0,50 fiala
  - B. 0,25 fiala
  - C. 2,5 fiale
  - D. 1 fiala
- 6. Alla valutazione di un paziente, noti che il turgore cutaneo si è ridotto. Di cosa potrebbe trattarsi?**
  - A. Il paziente dovrebbe assumere maggiori proteine
  - B. Il paziente è sottopeso
  - C. Il paziente è disidratato
  - D. Il paziente è sovrappeso
- 7. Le vertebre cervicali sono**
  - A. 9
  - B. 12
  - C. 10
  - D. 7
- 8. L'alterazione delle caratteristiche qualitative e quantitative della voce è detta ...**
  - A. Scialorrea
  - B. Distonia
  - C. Disfagia
  - D. Disfonia
- 9. Indichi quale dei seguenti comportamenti è opportuno seguire per evitare errori nella fase di somministrazione, sulla base delle raccomandazioni del Ministero della Salute:**
  - A. Disporre di una procedura per la conservazione dei farmaci ad "alto rischio"
  - B. Evitare prescrizioni incomplete o che generano confusione relativamente alla via di somministrazione e alla forma farmaceutica
  - C. Leggere attentamente al momento della somministrazione: il dosaggio, la concentrazione, la via di somministrazione, la scadenza, l'etichetta del farmaco, eventualmente la velocità della pompa di infusione e controllare le linee di raccordo
  - D. Richiedere nei capitolati d'acquisto l'assenza di situazioni di rischio (lo stesso colore delle confezioni per dosaggi diversi della stessa forma farmaceutica o il nome simile)
- 10. Per ipokaliemia si intende ...**
  - A. La riduzione della concentrazione serica del sodio (minore di 135 meq/l)
  - B. La diminuzione dei corpi chelanti nel sangue circolante
  - C. La riduzione della concentrazione serica di potassio (minore di 3,5 meq/l)
  - D. La riduzione della concentrazione serica di calcio

- 11. I sistemi di drenaggio urinario sono costituiti da un catetere, una sacca di drenaggio ed un circuito. Le caratteristiche principali del catetere sono: il diametro esterno (calibro), il numero di vie, il materiale e la consistenza. Se dovessimo inserire un catetere vescicale a lunga permanenza quale materiale è ritenuto più indicato:**
- Lattice
  - PVC
  - Silicone
  - Solo cateteri rivestiti in argento
- 12. Stai controllando gli esami ematochimici del signor Bianchi che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico. Quale dei seguenti valori è opportuno riportare tempestivamente al chirurgo?**
- INR: 1,1
  - Globuli rossi: 4,1 milioni/mm<sup>3</sup>
  - Emoglobina: 11,1 g/dl
  - Urea: 17 mg/dl
- 13. La Ricerca sulla prevenzione delle infezioni delle ferite chirurgiche ha dimostrato che la tricomia:**
- Va praticata almeno 6 ore prima dell'intervento
  - Va praticata la sera prima dell'intervento dopo una doccia con antisettico
  - Non è necessaria se viene praticata l'antibiotico profilassi preoperatoria
  - Va praticata 30 minuti prima dell'intervento
- 14. Stai assistendo a casa una persona adulta disabile diabetica in terapia insulinica che manifesta i seguenti sintomi: tremori, palpitazioni, sudorazione, astenia. Quali delle seguenti valutazioni ritieni possa essere corretta:**
- Il paziente potrebbe essere in una condizione di ipoglicemia
  - Il paziente potrebbe avere un problema cardiaco
  - I segni e sintomi descritti non mi permettono alcuna valutazione
  - Il paziente potrebbe essere in una condizione di iperglicemia
- 15. La signora Rossi presenta un Lesione da Pressione (LdP) a livello sacrale con queste caratteristiche: Dimensioni: 20 mm x 20 mm. Fondo: granulazione. Essudato: abbondante. Bordo arrossato. Cute circostante macerata. Non segni di infezione. Ferita che coinvolge l'epidermide e/o il derma. Secondo il sistema di stadiazione EPUAP e NPUAP, 2009 si tratta di:**
- Una LdP di III Stadio
  - Una LdP di II stadio che sta evolvendo al III stadio
  - Una LdP di II stadio
  - Una LdP di I stadio
- 16. Il momento più adatto per effettuare un prelievo per emocoltura è:**
- Quando la febbre cala per crisi
  - Nessuna delle altre risposte è corretta
  - In coincidenza di un rialzo termico con la comparsa di brividi
  - Dopo la somministrazione della prima dose di antibiotico prescritta
- 17. Il "Mansionario" dell'Infermiere (DPR. 225/74) viene abolito:**
- Con l'emanazione del profilo professionale
  - Con l'emanazione della Legge 26 febbraio 1999, n. 42
  - Con il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502
  - Nessuna delle altre risposte è corretta
- 18. In un'emergenza dove i polsi periferici non sono accessibili o palpabili, in quale dei seguenti siti dovrà essere rilevato il polso ?**
- Tibiale anteriore
  - Carotideo
  - Brachiale
  - Pedidio
- 19. Tutte le seguenti sono raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni correlate a catetere vescicale (CDC, 2009), eccetto:**
- Eeguire l'igiene delle mani prima e dopo la manipolazione del catetere
  - Sostituire il catetere vescicale settimanalmente
  - Non praticare di routine irrigazioni vescicali
  - Evitare movimenti o trazioni uretrali utilizzando dei sistemi di fissaggio del catetere vescicale alla coscia del paziente

20. **Quali dei seguenti segni deve saper riferire un paziente in terapia con anticoagulanti per via orale ?**
- A. Sanguinamento gengivale, ematuria, epistassi
  - B. Riniti, crisi asmatiche
  - C. Nevralgie, parestesie
  - D. Difficoltà alla deglutizione e odinofagia
21. **L'osservazione di un fenomeno in un intervallo di tempo breve rappresenta uno studio di:**
- A. Devianza
  - B. Varianza
  - C. Incidenza
  - D. Prevalenza
22. **L'indice di massa corporea o Body Mass Index (BMI):**
- A. Fornisce indicazioni sulla correlazione tra peso e statura e rappresenta un metodo analitico per stabilire il grado di sovrappeso
  - B. Fornisce indicazioni sulla massa lipidica totale corporea determinata in kilogrammi, con densità 0.9 grammi/ml
  - C. Serve a ricavare la quantità di acqua corporea
  - D. Serve alla quantificazione del tessuto adiposo sottocutaneo e della massa magra del soggetto preso in esame
23. **Un insieme di cellule unite a svolgere una medesima funzione costituisce:**
- A. Un apparato
  - B. Un tessuto
  - C. Un organo
  - D. Un organismo
24. **Il protocollo per la somministrazione di eparina prevede l'infusione di una soluzione con concentrazione pari a 50.000 Unità / 50 ml. Se la velocità di infusione della soluzione è di 2 ml/ora, quante unità di eparina sono state somministrate dopo 10 ore.**
- A. 5.000 u
  - B. 7.500 u
  - C. 20.000 u
  - D. 10.000 u
25. **Qual è la durata della gravidanza fisiologica?**
- A. 40 settimane
  - B. 36 settimane
  - C. 32 settimane
  - D. 37 settimane
26. **La manovra di Valsalva determina fra l'altro un ...**
- A. Aumento delle pressioni intraddominale ed intratoracica
  - B. Abbassamento delle pressioni intraddominale ed intratoracica
  - C. Aumento della pressione intratoracica ed abbassamento di quella intraddominale
  - D. Aumento della pressione intraddominale ed abbassamento di quella intratoracica
27. **Indicare quale dei seguenti modelli organizzativi è definito anche Primary Nursing di II livello.**
- A. Case Management
  - B. Day Nursing Management
  - C. Clinical Management
  - D. Nursing Funzionale
28. **Per eritema si intende ...**
- A. Colore rosso porpora a seconda del tempo di insorgenza
  - B. Tonalità rossastra con incremento della temperatura cutanea
  - C. Colore giallastro della pelle e delle sclere oculari
  - D. Tonalità blu-grigiastra della cute
29. **Il camice è utilizzato per ...**
- A. Proteggere cute e indumenti da materiale biologico
  - B. Prevenire l'inalazione di piccole particelle che possono contenere agenti infettivi trasmessi per via respiratoria
  - C. Proteggere gli occhi da schizzi di liquidi corporei
  - D. Prevenire il contatto con sangue
30. **La Legge 23.12.78 n. 833...**
- A. Istituisce il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere
  - B. Istituisce il Servizio Sanitario Nazionale
  - C. Definisce il Codice Deontologico dell'infermiere
  - D. Sostituisce la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" in "professione sanitaria"