

Questionario 51005009

- 1. L'Amiodarone è un farmaco che, per evitare precipitati, deve essere diluito:**
 - A. In una soluzione elettrolitica
 - B. In una soluzione fisiologica
 - C. In una soluzione glucosata al 5%
 - D. In una soluzione qualsiasi purché ipertonica
- 2. Immediatamente dopo aver fatto assumere una compressa del farmaco "x" all'assistito bisogna ...**
 - A. Controllare il dosaggio del farmaco
 - B. Accertarsi dell'avvenuta assunzione del farmaco
 - C. Chiedergli se è allergico al farmaco somministrato
 - D. Controllare l'identità dell'assistito
- 3. Nel caso dello svuotamento della vescica con un cateterismo intermittente a causa di una ritenzione acuta di urina, quali delle seguenti complicanze si prevengono con uno svuotamento graduale?**
 - A. Iperensione arteriosa, secchezza delle mucose
 - B. Ematuria, ipotensione arteriosa, pallore, sudorazione
 - C. Ematuria, infezione delle vie urinarie, iperemia cutanea
 - D. Ipotensione arteriosa, polidipsia, rettorragia
- 4. Devi posizionare la padella a una persona che non può sollevare il bacino; qual è la prima posizione da far assumere?**
 - A. Laterale
 - B. Prona
 - C. Trendelemburg
 - D. Fowler
- 5. Quali sono le fasi dell'andamento della febbre?**
 - A. Fase del rialzo termico o prodromica, fase dell'acme, fase della defervescenza
 - B. Fase terzana, fase quartana e fase quintana
 - C. Fase ricorrente, fase erratica, fase ondulante
 - D. Fase intermittente, fase ricorrente, fase ondulante
- 6. Presentazione clinica tipica del diabete di tipo I:**
 - A. Inizio subdolo con anoressia e dimagrimento
 - B. Inizio acuto con sete, poliuria e dimagrimento
 - C. Inizio subdolo in soggetti in sovrappeso, sedentari
 - D. Inizio acuto con sudorazione profusa, inquietudine, poliuria
- 7. Indicare quale delle seguenti normative ha modificato in modo sostanziale l'assetto del Servizio Sanitario Nazionale istituito nel 1978.**
 - A. D.lgs. 502/92
 - B. Testo Unico delle Leggi Sanitarie
 - C. D.lgs. 494/96
 - D. D.lgs. 22/97
- 8. Le seguenti affermazioni sono tutte riferibili alle caratteristiche di un monitoraggio continuo della PVC (Pressione Venosa Centrale), eccetto una, quale?**
 - A. Può essere rilevata attraverso la via distale di un catetere venoso centrale
 - B. Il suo monitoraggio in continuo necessita di una linea con trasduttore di pressione
 - C. Viene rilevata attraverso un catetere arterioso periferico
 - D. Fornisce informazioni circa il pre-carico dell'atrio destro
- 9. In caso di errori derivanti da una attività delegata:**
 - A. Risponde sempre e solo il delegato
 - B. Risponde il delegante se ha commesso errori nel processo di delega e il delegato qualora abbia commesso errori di esecuzione dell'attività
 - C. Rispondono in egual misura sia delegante che delegato
 - D. Risponde il dirigente responsabile
- 10. Le feci picee corrispondono a quale delle seguenti condizioni:**
 - A. Feci formate e biancastre
 - B. Feci liquide e francamente ematiche
 - C. Feci formate e striate di sangue rosso vivo
 - D. Feci liquide e nerastre


11. Durante l'esame obiettivo della funzione motoria rilevi un aumento del tono muscolare con eccessiva resistenza ai movimenti passivi. Definisci ciò come ...

- A. Cifosi
- B. Ipotonia
- C. Scoliosi
- D. Ipertonìa

12. Quale delle seguenti scale utilizzi per valutare il dolore in un bambino di 5 anni?

- A. Scala Analogica Visiva
- B. Scala Tinetti
- C. Scala delle Espressioni Facciali (Wong-Baker)
- D. Scala Numerica Verbale

13. Stai svolgendo assistenza presso un reparto di medicina e durante il turno notturno ti trovi nella seguente situazione: paziente collegato al monitor, incosciente con il seguente tracciato elettrocardiografico...



Quali delle seguenti azioni è prioritaria:

- A. Chiami il medico reperibile perché venga subito in reparto
- B. Aspetti, ma per non più di un minuto, per vedere se la situazione si modifica spontaneamente
- C. Predisponi il defibrillatore semi-automatico per effettuare una scarica elettrica
- D. Inizi a praticare la ventilazione manuale

14. Con il termine "atelectasia polmonare" si suole indicare:

- A. L'aumentata distanza tra i due polmoni
- B. Il collassamento di un'area polmonare
- C. L'asportazione di un lobo polmonare
- D. Il riempimento con liquido di un'area polmonare

15. Il signor Rossi presenta un lesione da pressione a livello sacrale con queste caratteristiche: Dimensioni: 20mm x 35mm. Fondo: granulazione. Essudato abbondante. Bordo arrossato. Cute circostante macerata. Fistole assenti. Lesione maleodorante. Ferita a tutto spessore con estesa distruzione dei tessuti, danno ai muscoli, ossa e strutture di supporto. Secondo il sistema di stadiazione EPUAP e NPUAP, 2009 si tratta di:

- A. Una LdP di IV stadio
- B. Una LdP di II stadio
- C. Una LdP di IV stadio che sta evolvendo in escara
- D. Una LdP di III Stadio

16. Il segno di Blumberg se presente sta ad indicare:

- A. L'infiammazione della membrana pleurica
- B. L'infiammazione della membrana peritoneale
- C. L'infiammazione della membrana pericardica
- D. L'infiammazione della membrana meningea

17. Qual è la PRIMA COSA da valutare quando si scorge una persona distesa a terra?

- A. Il polso periferico
- B. La pervietà delle prime vie aeree
- C. Nessuna delle altre risposte è corretta
- D. La risposta alla chiamata o allo stimolo doloroso

18. La misura della distanza naso - trago - xifoide del paziente serve all'infermiere per ...:

- A. Calcolare il rapporto BMI
- B. Calcolare il valore relativo all'espansione toracica durante una inspirazione forzata
- C. Calcolare la superficie corporea
- D. Approssimare la lunghezza del sondino naso gastrico da introdurre

19. Il set per infusione rappresenta il sistema che permette il collegamento tra il flacone contenente la soluzione e l'accesso venoso. Secondo le linee guida del CDC di Atlanta del 2011 si raccomanda di sostituire le linee infusive in continuo, non contenenti emulsioni di lipidi, sangue e derivati, e se non contaminate, ogni:

- A. 12 ore
- B. 6 ore
- C. 24 ore
- D. 96 ore

20. **Il polso viene rilevato in più sedi tra cui quelle corrispondenti ai seguenti vasi ad eccezione di uno. Quale ?**
- A. Giugulare
 - B. Carotide
 - C. Brachiale
 - D. Ulnare
21. **Se vengono prescritti 750 mg di antibiotico disponibili in confezione anidra - flaconcino da 1g + fiala diluente da 4ml - una volta disciolta la soluzione quale delle seguenti quantità dovrà essere somministrata?**
- A. 1,750 ml
 - B. 0,750 ml
 - C. Nessuna delle altre risposte è corretta
 - D. 3,000 ml
22. **In quale settore del tubo digerente si riversa il secreto della ghiandola pancreatica?**
- A. Nell'ileo
 - B. Nel digiuno
 - C. Nel duodeno
 - D. Nell'intestino crasso
23. **Deve infondere 600 ml di soluzione di Glucosio al 5% in 10 ore. Non dispone di una pompa di infusione e il deflussore in utilizzo nel reparto presenta questa caratteristica: 20 gocce = 1 ml. A quante gocce al minuto regola il deflussore?**
- A. 10 gocce/minuto
 - B. 20 gocce/minuto
 - C. 15 gocce/minuto
 - D. 5 gocce/minuto
24. **La distruzione di ogni microrganismo vivente, patogeno e non, in forma vegetativa o di spora attraverso procedimenti fisici e/o chimici, si definisce ...**
- A. Decontaminazione
 - B. Detersione
 - C. Sterilizzazione
 - D. Disinfezione
25. **Quale tra le seguenti affermazioni non è vera?**
- A. Il lavaggio delle mani da parte del personale sanitario riduce le infezioni ospedaliere
 - B. Infermieri, medici e altri operatori sanitari possono avere centinaia o migliaia microbi sulle loro mani, solo per avere eseguito procedure comuni
 - C. Il lavaggio frequente delle mani con acqua e antisettico può causare irritazione della cute
 - D. Maggiore è il carico di lavoro infermieristico, maggiore è la frequenza di lavaggio delle mani da parte del personale sanitario
26. **Il turgore giugulare ...**
- A. È presente comunemente nel 50% della popolazione
 - B. È un segno tipico dell'aumento della pressione venosa centrale
 - C. È un segno tipico di ipovolemia
 - D. È un segno tipico dello shock settico
27. **L'art. "L'Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento" è contenuto:**
- A. Nella Legge n. 42/1999
 - B. Nel D.Lgs.n. 229/1999
 - C. Nel D.Lgs. n. 502/1992
 - D. Nel codice deontologico dell'infermiere del 2019
28. **La valutazione neurologica di un paziente rileva: vigile e orientato, muove tutte le estremità, esegue ordini semplici, pupille foto-reagenti, di dimensioni destra 3 mm, sinistra 4 mm. Nella precedente valutazione le pupille erano isocoriche. Basandosi su questi dati, la sua priorità sarà:**
- A. Comunicare immediatamente al medico l'anisocoria
 - B. Rilevare il punteggio della Glasgow Coma Scale (GCS)
 - C. Valutare accuratamente la funzione motoria del paziente
 - D. Non fare niente in quanto l'anisocoria è normale in una certa percentuale di popolazione

29. Un paziente è ricoverato in chirurgia da 6 giorni a seguito di un trauma toracico destro che ha causato la frattura di 4 coste. Ha in sede un drenaggio toracico (tipo Pleurevac®). Durante l'attività di monitoraggio osservi che vi è assenza di gorgogliamento nella valvola ad acqua. Dopo aver appurato che il circuito di drenaggio è pervio e funzionante ritieni che si tratti di:

- A. Una situazione normale poiché non vi è mai gorgogliamento nella valvola ad acqua
- B. Una situazione anomala che necessita un aumento del sistema di aspirazione
- C. Una situazione anomala che indica una modifica delle condizioni del paziente
- D. Una situazione fisiologica che evidenzia l'assenza di aria nella cavità pleurica

30. Cosa si intende per oliguria in riferimento ad un paziente adulto che pesa 70-80 kg ca.?

- A. Una diuresi ≤ 100 cc/24 ore
- B. La completa assenza di diuresi nelle 24 ore
- C. Una diuresi ≤ 1500 cc/24 ore
- D. Una diuresi ≤ 500 cc/24 ore