

## LA MIA VITA CAMBIA?

Le persone in trattamento dialitico, portatrici di CP, non sono differenti dalle altre.

Coloro che non fanno parte del nucleo familiare, molto probabilmente non si accorgeranno della presenza del CP.

**Il trattamento dialitico non è incompatibile con lo svolgimento delle attività di vita quotidiana: compatibilmente con lo stato di salute, ci si potrà dedicare all'attività lavorativa, si potranno coltivare hobby, interessi, passioni, si potrà guidare, si potrà viaggiare, si potrà praticare attività sportiva, si potrà avere una vita sessuale attiva. Semplicemente sarà necessario adottare tutti quei comportamenti atti a mantenere in sede e funzionale il CP, prevenire i traumatismi, prevenire le infezioni ecc.**

## COSA NON E' OPPORTUNO FARE?

- Non si devono utilizzare abiti stretti, con elastici e/o cinture che costringono a livello addominale
- Non si deve trazionare il CP
- Non si deve effettuare depilazione / rasatura vicino alla medicazione del CP



## NUMERI UTILI

### DIALISI VARESE

(aperto dalle ore 06.30 alle 20.45)

Tel. 0332.393019 / 0332.393029 / 0332.393021

### DIALISI TRADATE

(aperto dalle ore 06.00 alle 19.00)

Tel. 0331.817393 / 0331.817509


## QUANDO CONTATTARE IL CENTRO DIALISI?

- In caso di **Infezione** della zona intorno alla quale fuoriesce dall'addome il CP (potrebbe presentare gonfiore e/o arrossamento, con possibili secrezioni, potrebbe percepire dolore);
- In caso di **Peritonite** (di norma provoca dolore addominale, febbre, nausea, vomito, il liquido di scarico risulta torbido);
- In caso di dubbi, difficoltà, se non ci si ricorda le spiegazioni ricevute.



DAPSS  
Direzione Assistenziali Professioni  
Sanitarie e Sociali


## HO IL CATETERE PERITONEALE (CP) COME MI COMPORTO?



A cura del Gruppo Ricerca e  
Miglioramento Continuo della DAPSS

## COS' È IL CATERE PERITONEALE (CP)?

Il CP è un dispositivo (di silicone) che viene posizionato all'interno dell'addome. Viene posizionato in Sala Operatoria, in anestesia locale. Attraverso il Catetere Peritoneale è possibile eseguire il trattamento dialitico a domicilio.



L'infermiere si occupa dell'educazione alla gestione del trattamento dialitico e del CP.

## COME DEVO COMPORTARMI PER EVITARE RISCHI?

Il punto di inserzione del CP rappresenta una porta di ingresso per i microorganismi.

I microorganismi potrebbero provocare infezioni.

**L'IGIENE PERSONALE, DELL'AMBIENTE DOVE SI EFFETTUA LA DIALISI E DELL'ABBIGLIAMENTO E' MOLTO IMPORTANTE!**


## **E' FONDAMENTALE ESEGUIRE LE CURE IGIENICHE TUTTI I GIORNI.**

È consigliato eseguire la doccia (da preferire al bagno) in quanto lo sporco viene portato via dall'acqua corrente.



## QUALE ABBIGLIAMENTO INDOSSARE?

Si può scegliere qualsiasi tipologia di abbigliamento. L'unica accortezza è quella di indossare abiti non stretti che, sfregando sulla medicazione, potrebbero provocare irritazione alla cute. È inoltre necessario porre attenzione agli abiti con elastici e/o cinture che possono costringere a livello addominale.




Durante la seduta dialitica sarà sufficiente liberare dagli abiti la zona dove è stato posizionato il CP e far fuoriuscire dal dispositivo di fissaggio il CP.



**AVERE UN CP NON PREGUIDICA LA POSSIBILITA' DI TENERE CON SE' UN ANIMALE DOMESTICO** (è fondamentale l'igiene dell'animale e che lo stesso non venga a contatto con la zona dove è stato posizionato il CP).

## COME ESEGUIRE LA MEDICAZIONE?



- Prima e dopo ogni scambio e prima di manipolare la medicazione è necessario indossare una **MASCHERINA** pulita;
- Prima e dopo ogni scambio e prima di manipolare la medicazione è necessario eseguire l'**IGIENE DELLE MANI**;
- Controllare quotidianamente la presenza di eventuali secrezioni o rossori;
- Pulire con movimenti circolari dall'interno all'esterno;
- Rinnovare la medicazione ruotando il cerotto di fissaggio per evitare irritazioni;
- Fissare il catetere esterno.

