

Quiz 1

DATA

FIRMA



1. L'ernia inguinale diretta è:
 - A. Un'ernia che fuoriesce medialmente ai vasi epigastrici
 - B. Un'ernia che fuoriesce lateralmente ai vasi epigastrici
 - C. Un'ernia che attraversa il canale otturatorio
2. Il lobo caudato del fegato corrisponde al:
 - A. I segmento
 - B. II segmento
 - C. III segmento
3. Il test di Perthes valuta:
 - A. La pervietà del circolo venoso profondo
 - B. La continenza del circolo venoso superficiale
 - C. Il flusso del circolo arterioso

4. Quale tra i seguenti sintomi e segni, pur presenti in caso di perforazione del tubo gastro-intestinale, ne è segno patognomonico?

- A. Leucocitosi
- B. Contrattura dei muscoli addominali
- C. Scomparsa dell'aia di ottusità epatica

5. Di quale arteria è ramo l'arteria emorroidaria superiore

- A. Arteria pudenda
- B. Arteria sigmoidea
- C. Arteria mesenterica inferiore

6. Da quali strutture è delimitato il triangolo di Calot?

- A. Arteria cistica, vena porta, colecisti
- B. Colecisti, fegato, legamento rotondo
- C. Dotto cistico, dotto epatico comune, margine inferiore del fegato

7. Quale dei seguenti tumori della tiroide è associato ad altri tumori endocrini nella MEN II:

- A. adenocarcinoma papillifero
- B. adenocarcinoma midollare
- C. adenocarcinoma follicolare

8. Nell'adenocarcinoma dell'esofago, secondo le linee guida del 2018, lo stadio IIB corrisponde a:

- A. T1N1M0
- B. T2N0M0
- C. T2N1M0



9. Con il termine di acalasia esofagea si intende:
- A. Una sindrome da alterata motilità esofagea con incoordinazione dei movimenti peristaltici e mancato rilasciamento dello sfintere esofageo inferiore
 - B. Una atresia completa congenita del terzo inferiore dell'esofago
 - C. Una stenosi organica dello sfintere esofageo inferiore per reflusso di materiale gastrico acido
10. La più frequente causa di costituzione di una fistola bilio-digestiva è:
- A. Ulcera gastrica o duodenale
 - B. Calcolosi biliare
 - C. Carcinomi dello stomaco
11. Per sfintere esofageo superiore si intende:
- A. Una zona ad alta pressione endoluminale disposta tra ipofaringe ed esofago lunga circa tre cm
 - B. Una struttura anatomica costituita da fibre muscolari lisce situata tra esofago cervicale e toracico
 - C. Un ipertono della muscolatura liscia dell'esofago toracico
12. Indicare il segno clinico caratteristico della lesione monolaterale del nervo ricorrente:
- A. Disfagia
 - B. Disfonia
 - C. Gastroparesi
13. Rami terminali dell'arteria epatica comune sono:
- A. Arteria gastroduodenale ed arteria epatica propria
 - B. Arteria gastroeiploica destra ed arteria gastroduodenale
 - C. Arteria gastroeiploica destra ed arteria pancreatico-duodenale antero-superiore



14. La tecnica di Belsey Mark-IV è un:
- A. Intervento di iatoplastica diaframmatica
 - B. Intervento di derivazione gastro-digestiva
 - C. Intervento a livello del surrene che comporta l'ischemia a freddo del rene
15. La sede più frequente della ragade anale è:
- D. commissura mediana anteriore
 - E. commissura mediana posteriore
 - F. in qualsiasi punto
16. Il feocromocitoma prende origine:
- A. dal tessuto cromaffine della midollare del surrene
 - B. dalla midollare del rene
 - C. dalla zona reticolare del surrene
17. L'Early Gastric Cancer:
- A. Può essere associato a metastasi ovariche
 - B. E' limitato alla mucosa ed alla sottomucosa
 - C. E' limitato solo alla mucosa
18. Nel morbo di Basedow la chirurgia:
- A. Si applica solo in casi selezionati
 - B. Non trova alcuna applicazione
 - C. Rappresenta la terapia di scelta
19. In quale dei seguenti casi è indicato il posizionamento di un filtro cavale definitivo:
- A. nelle TVP femoro-iliaco-cavali
 - B. in tutte le TVP
 - C. nelle TVP femoro-poplitee



20. Di quale vena è tributaria la vena splenica?

- A. Vena cava
- B. Vena porta
- C. Vena mesenterica inferiore

21. Quale complicanza consegue, con maggiore frequenza, ad una frattura costale:

- A. pneumotorace
- B. emotorace
- C. emopneumotorace

22. Nel carcinoma del retto il trattamento chirurgico ha una sopravvivenza a 5 anni in caso di N+ del:

- A. 15%
- B. 45%
- C. 30%

23. La diagnosi differenziale tra cisti della mammella e una tumefazione solida si avvale soprattutto di una delle seguenti indagini:

- A. Mammografia
- B. RMN
- C. Ecografia

24. Per quanto riguarda l'ernia iatale da scivolamento una delle seguenti è la complicanza più frequente:

- A. Esofagite peptica
- B. Disfagia ai liquidi
- C. Incarceramento

25. Qual è la causa più comune di iperparatiroidismo primario?

- A. Adenoma paratiroideo
- B. Adenoma di Plummer
- C. Gozzo plurinodulare



26. Qual'è l'eziopatogenesi del megacolon congenito?
- A. aganglionismo del retto-sigma
 - B. ipertonía del simpatico
 - C. Ipertonía vagale
27. L'arteria tiroidea superiore è un ramo della:
- A. Arteria carotide comune
 - B. Arteria carotide interna
 - C. Arteria carotide esterna
28. La mastectomia radicale secondo Madden comporta l'asportazione di quali strutture?
- A. mammella, linfonodi ascellari, grande e piccolo pettorale
 - B. mammella, linfonodi ascellari, grande pettorale
 - C. mammella, linfonodi ascellari
29. I diverticoli esofagei più frequenti sono quelli:
- A. Del terzo superiore del corpo dell'esofago
 - B. Faringo-esofagei
 - C. Epifrenici
30. Nel carcinoma del retto lo stadio IIIA, secondo le linee guida del 2018 corrisponde a:
- A. T2N2bM0
 - B. T1N2aM0
 - C. T1N2bM0