



Quiz 2

DATA 25/11/2020

FIRMA

Luca D'Amico

1. Da cosa è costituito il sacco erniario?
 - A. Dal peritoneo viscerale
 - B. Dal peritoneo parietale
 - C. Dai visceri erniati e dal peritoneo parietale
2. La disfagia paradossa deve far pensare a:
 - A. stenosi organica dell'esofago
 - B. patologia funzionale dell'esofago
 - C. tumore del cardias
3. La principale complicanza del cancro del colon discendente è:
 - A. metastasi
 - B. Rettoraggia
 - C. occlusione o subocclusione
4. La formazione del diverticolo faringo-esofageo (di Zenker) è legata:
 - A. Incoordinazione motoria
 - B. La patogenesi è congenita
 - C. Le due precedenti

5. Con quale manovra della semeiotica fisica è valutabile la presenza di liquido libero in peritoneo:
- A. Palpazione
 - B. Percussione
 - C. Paracentesi
6. Qual è la complicanza più frequente di una biopsia epatica?
- A. Coleperitoneo
 - B. Emoperitoneo
 - C. Aerobilia
7. Qual è il segno clinico o sintomo più frequente del carcinoma della papilla di Vater?
- A. Ittero
 - B. Emorragia digestiva
 - C. Dolore
8. Quale tra i seguenti tipi di disfagia è più comune in caso di acalasia nella fase iniziale?
- A. Per i cibi liquidi
 - B. Per i cibi solidi
 - C. Per i cibi liquidi e solidi
9. Un difetto congenito di formazione del diaframma è causa di:
- A. Ernia iatale paraesofagea
 - B. Ernia iatale da scivolamento
 - C. Ernia postero-laterale di Bochdalek
10. L'ernia di Littré contiene
- A. Ovaio con salpinge
 - B. Diverticolo di Meckel
 - C. Testicolo
11. Il più frequente tipo di carcinoma infiltrante della mammella è:
- A. Quello lobulare
 - B. Quello duttale
 - C. Quello midollare
12. Quale dei seguenti interventi chirurgici può determinare un rallentamento del tempo di svuotamento gastrico?
- A. Gastroenteroanastomosi
 - B. Antrectomia
 - C. Correzione di una ernia iatale mediante funduplicatio



13. Dove sono situati i linfonodi ascellari di secondo livello?
- A. Sotto il muscolo piccolo pettorale
 - B. Medialmente al muscolo piccolo pettorale
 - C. All'apice del cavo ascellare
14. Fra i sintomi di una sindrome mediastinica, quale compare più tardivamente?
- A. disfagia
 - B. singhiozzo
 - C. turgore venoso
15. Secondo la Classificazione di Bismuth il tipo 2
- A. Tumore sotto la confluenza dei dotti epatici di destra e sinistra
 - B. Tumore che raggiunge la confluenza ma non coinvolge i dotti epatici
 - C. Tumore che occlude il dotto epatico comune e il dotto epatico di destra (3a) o di sinistra (3b)
16. La Dumping Sindrome è dovuta a:
- A. malformazioni anatomiche
 - B. esiti di chirurgia gastrica
 - C. interventi sull'ileo
17. L'ernia inguinale congenita:
- A. Implica l'agenesia del dotto peritoneo-vaginale
 - B. Implica l'anomala persistenza del dotto peritoneo-vaginale
 - C. Non differisce dal punto di vista anatomo-patologico da quella acquisita
18. Il lobo di Spigolio è sinonimo di quale segmento epatico:
- A. 8°
 - B. 1°
 - C. 4°
19. Nella sindrome da carcinoide quale delle seguenti sostanze si libera:
- A. Cistochinina
 - B. Reinina
 - C. Serotonina



20. Il volvolo gastrico può costituire una complicanza di quale tipo d'ernia iatale:
- A. da scivolamento
 - B. paraesofagea
 - C. mista
21. Secondo l'ottava edizione del TNM sulle neoplasie del pancreas esocrino lo stadio IIA è:
- A. T1N0M0
 - B. T2N0M0
 - C. T3N0M0
22. Il circolo collaterale che mette in comunicazione l'arteria mesenterica inferiore con la superiore si chiama:
- A. Arteria di Drummond
 - B. Arteria di Rushow
 - C. Arcata di Riolo
23. Il segno di Troisier è:
- A. Una metastasi linfonodale sopraclavicolare
 - B. Un segno di ipocalcemia
 - C. Il riscontro clinico di epatomegalia da probabile metastatizzazione epatica
24. In quale delle seguenti ernie è più frequente lo strozzamento?
- A. Ernia ombelicale
 - B. Ernia crurale
 - C. Ernia inguinale obliqua esterna
25. La vena emiazigos si getta:
- A. nella vena cava superiore
 - B. nella vena succlavia sinistra
 - C. nella vena azigos
26. La stenosi ipertrofica del piloro è dovuta a:
- A. Ipertrofia della muscolatura circolare del piloro
 - B. Ipertrofia della muscolatura longitudinale del piloro
 - C. Iperattività del sistema nervoso simpatico
27. Quale temibile complicanza può conseguire alla chirurgia sull'aorta toracica discendente:
- A. A ischemia cerebrale
 - B. paraplegia
 - C. angina instabile

28. Qual è l'esame di prima scelta nella diagnostica degli itteri colestatici
- A. colangio RMN
 - B. ecografia addominale
 - C. ERCP
29. Le metastasi epatiche da carcinoma del colon sono più frequentemente:
- A. ipoecogene
 - B. iperecogene
 - C. isoecogene
30. Nei tumori tumori ilari (Klatskin) di Tipo II è indicato:
- A. Resezione in blocco dei dotti biliari extraepatici e della colecisti, linfadenectomia regionale, epaticodigiunostomia con ansa alla Roux.
 - B. Come sopra ed in più epatectomia destra o sinistra.
 - C. Come sopra ed in più epatectomia destra o sinistra estesa

