



Quiz 3

DATA

FIRMA

1. L'adenoma a cellule di Hurtle è:
 - A. Una lesione sicuramente benigna
 - B. Una lesione sicuramente maligna
 - C. un istotipo a se stante
2. La linea di Malgaigne:
 - A. consente di distinguere le ernie inguinali da quelle crurali
 - B. corrisponde alla linea bisiliaca
 - C. corrisponde alla linea ombelicale trasversa
3. Il segno di Trousseau e/o di Chvostek sono espressione:
 - A. Tetania latente
 - B. Ipercalcemia
 - C. Tetania da iperparatiroidismo
4. Il fenomeno o segno di Curvoisier-Terrier indica specificatamente:
 - A. Palpazione di una colecisti distesa in caso di un tumore cefalopancreatico
 - B. Colecisti non estensibile e non palpabile per retrazioni flogistiche nella calcolosi del coledoco
 - C. Empiema della colecisti che diviene dolente e palpabile
5. La sindrome di Conn è più spesso sostenuta da:
 - A. Adenoma corticosurrenale
 - B. Aumento dell'incrizione di ACTH
 - C. Carcinoma del corticosurrene

14. Secondo i criteri di Ranson entro 48 ore hanno prognosi peggiore i pazienti con?
- A. $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$
 - B. $\text{AST} > 250 \text{ U/l}$
 - C. deficit di liquidi $> 2 \text{ l}$
15. Quale dei seguenti segmenti enterici non è vascolarizzato dall'arteria mesenterica inferiore?
- A. Colon ascendente
 - B. Colon trasverso
 - C. Colon discendente
16. Va più frequentemente incontro a perforazione l'ulcera situata:
- A. Sulla piccola curva gastrica
 - B. Sulla parete anteriore del duodeno
 - C. Sulla parete posteriore del duodeno
17. La localizzazione più frequente di gastrinomi è:
- A. Antro gastrico
 - B. Duodeno
 - C. Pancreas
18. Criteri TAC di Balthazar sono comunemente utilizzati per:
- A. Valutare i quadri di colangite acuta
 - B. Valutare i quadri di pancreatite acuta
 - C. Valutare i quadri di neoplasie del pancreas
19. Fra le fratture indirette non sono comprese quelle:
- A. per trauma trasmesso
 - B. per torsione
 - C. in sede di applicazione di un trauma
20. La sindrome di Ogilvie è caratterizzata da:
- A. Ittero
 - B. Ileo dinamico
 - C. Ileo paralitico



28. Il reperto anatomopatologico di un fegato diffusamente duro con nodosità multiple e a superficie granulosa fa pensare a:

- D. Carcinoma colangiocellulare
- E. Carcinoma epatocellulare
- F. Cancrocirosi

29. Con quali vene il circolo portale è anastomizzato alla cava inferiore:

- A. Basiliche
- B. Esofagee inferiori
- C. Mammarie

30. Qual è l'esame dirimente per la diagnosi differenziale dei noduli solitari della tiroide?

- A. Scintigrafia tiroidea
- B. Ecografia tiroidea
- C. Esame citologico su agoaspirato

