

PROVA SCRITTA N.1

1. L'impianto cocleare non è indicato in quale malformazione dell'orecchio interno?
 - Otocisti rudimentale
 - Ipoplasia cocleare
 - Cavità comune
 - Acquedotto allargato
2. Nella bud-like coclea:
 - Il setto interscalare e il modiolo non sono riconoscibili
 - È riconoscibile il modiolo ma mai il setto interscalare
 - È riconoscibile il modiolo e talvolta il setto interscalare
 - Il setto interscalare e il modiolo sono riconoscibili
3. Nella classificazione di Sennaroglu del 2017 quanti giri di coclea sono presenti in CI -III?
 - <2
 - <2,25
 - <1,75
 - <1,70
4. La sindrome di minor è caratterizzata dalla deiscenza del
 - Canale semicircolare laterale
 - Canale semicircolare superiore
 - Utricolo
 - Sacculo
5. L'indicazione all'impianto cocleare nell'adulto con sordità post verbale è prevista nei casi di riconoscimento verbale inferiore al:
 - 60%
 - 50%
 - 40%
 - 30%
6. Le mutazioni nel gene PAX 3 si identificano nella sindrome di Waandeburg:
 - Tipo 1 e tipo 2
 - Tipo 1 e tipo 3
 - Tipo 2 e tipo 3
 - Tipo 2 e tipo 4
7. L'elettrodo dell'impianto cocleare dovrebbe essere inserito:
 - Nella scala vestibolare
 - Nella scala timpanica
 - Nel dotto cocleare
 - Indifferentemente nella scala timpanica, nella scala vestibolare, nel dotto cocleare

8. La crista fenestrae è un semidiaframma osseo che si rileva nella porzione:
 - Endococleare della finestra rotonda
 - Extracocleare della finestra rotonda
 - Endococleare della finestra ovale
 - Extracocleare della finestra ovale
9. Il gene GJB2 quando mutato è responsabile di quali sordità?
 - DFNB1 e DFNA3
 - DFNB 2
 - DFNB 1 e DFNB 2
 - DFBN 3
10. L'alfa mannosidosi è caratterizzata da ipoacusia di forma:
 - Mista
 - Trasmissiva
 - Trasmissiva o mista, mai percettiva
 - Trasmissiva, mista e percettiva
11. Nella sindrome di Cogan:
 - La cheratite interstiziale si associa a vertigini, tinnito ed ipoacusia
 - E' sempre associata a vasculite sistemica
 - La compromissione renale è frequente
 - La nefrite interstiziale si associa a vertigini, tinnito e ipoacusia
12. Nella sindrome di Alström l'ipoacusia si sviluppa:
 - Nel 70% dei pazienti nei primi 10 anni di vita
 - Nel 50% dei pazienti nei primi 20 anni di vita
 - Nel 50% dei pazienti nei primi 10 anni di vita
 - Nel 70% dei pazienti nei primi 20 anni di vita
13. Il fenotipo LEOPARD può essere associato più probabilmente a quale sindrome?
 - Noonan
 - Stickler
 - CHARGE
 - Treacher-Collins
14. Il diametro normale dell'acquedotto vestibolare è:
 - 1 mm
 - 1,5 mm
 - 2 mm
 - 2,5 mm
15. L'ossificazione cocleare meningogenica ha spesso una progressione:
 - Dal giro basale a quello apicale
 - Dal giro apicale a quello basale
 - Dal giro intermedio per poi interessare in senso centrifugo il giro basale e apicale
 - Colpisce spesso contemporaneamente tutti i giri cocleari