

ASST SETTE LAGHI

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE CAT. D

PROVA **A**

1. In relazione al Microclima, indicare l'alternativa CORRETTA:

- A. è lo stato di piena soddisfazione nei confronti dell'ambiente e non costituisce una condizione indispensabile e prioritaria per il conseguimento del benessere del paziente
- B. i valori fisiologici di temperatura interna del corpo umano sono compresi tra 35,2°C e 38,2°C
- C. è un insieme di parametri ambientali che condizionano lo scambio termico tra un individuo e l'ambiente circostante in un luogo chiuso
- D. il microclima è importante solo per le camere di degenza singole

2. Quali di questi vasi giunge all'atrio destro?

- A. aorta
- B. vena basilica
- C. arteria radiale
- D. vena cava superiore

3. Un paziente con fenotipo AB0 corrispondente ad A deve essere trasfuso con emazie concentrate: quali fenotipi sono compatibili?

- A. prima scelta A, seconda scelta AB
- B. prima scelta 0, seconda scelta B
- C. sempre e solo AB
- D. prima scelta A, seconda scelta 0

4. Per somministrare infusioni tramite un catetere totalmente impiantabile o port-a-cath, quale tipologia di ago si può utilizzare?

- A. ago da biopsia
- B. ago a farfalla
- C. ago cannula
- D. ago di Huber

5. Quale tipologia di isolamento si applica per il Clostridium Difficile?

- A. contatto
- B. droplets
- C. aerea
- D. ematica

6. Quale dei seguenti ali

- A. pastina in brodo
- B. arrosto e fagiolini
- C. semolino
- D. minestrone con riso

7. Per poliuria si intende

- A. un'escrezione urinaria mag
- B. un'escrezione urinaria maggiore di 1 litro nell'arco di 24 ore
- C. un'escrezione urinaria minore di 1,5 litri nell'arco di 24 ore
- D. un'escrezione urinaria minore di 0,5 litri nell'arco di 24 ore

8. La scala di Braden:

- A. è uno strumento per la valutazione del rischio di lesioni da pressione
- B. è uno strumento per la valutazione del rischio cadute
- C. è uno strumento per la valutazione del rischio di depressione nell'anziano fragile
- D. è uno strumento per il calcolo della dipendenza dell'assistito

- 9. Quali sono i valori normali della Frequenza Respiratoria in un adulto sano a riposo?**
- A. 70-90 atti/min
 - B. 12-20 atti/min
 - C. 3-6 atti/min
 - D. 20-30 atti/min
- 10. Il momento migliore (timing) per effettuare un prelievo per emocoltura è:**
- A. durante il picco febbrile
 - B. dopo la somministrazione di antibiotico
 - C. sempre la prima mattinata
 - D. dopo un pasto abbondante
- 11. Per afasia si intende:**
- A. l'incapacità di riconoscere i volti
 - B. la visione sdoppiata di un oggetto singolo
 - C. l'incapacità di esprimersi mediante la parola o di comprendere il significato delle parole dette da altri
 - D. la difficoltà ad urinare
- 12. La pleura è:**
- A. una membrana sierosa che avvolge intimamente il cuore
 - B. una membrana sierosa che avvolge intimamente i polmoni
 - C. una membrana sierosa che avvolge intimamente gli organi addominali
 - D. una membrana sierosa che avvolge intimamente il fegato
- 13. In condizioni fisiologiche, il valore della Natremia (sodiemia):**
- A. è di circa 105-130 mEq/L
 - B. è di circa 3,5-5,0 mEq/L
 - C. è di circa 135-145 mEq/L
 - D. è di circa 175-200 mEq/L
- 14. Al signor Mario Rossi si deve somministrare Gentamicina 40 mg per via intramuscolare. Si ha a disposizione una fiala di Gentamicina da 80 mg/2 ml, quanti ml devono essere prelevati?**
- A. 0,5 ml
 - B. 2 ml
 - C. 1 ml
 - D. 4 ml
- 15. Al fine del corretto processo di sterilizzazione dei set chirurgici, i ferri chirurgici devono essere sottoposti in ordine corretto alle seguenti fasi del processo:**
- A. lavaggio – decontaminazione – asciugatura
 - B. sterilizzazione – decontaminazione – disinfezione
 - C. lavaggio – asciugatura – decontaminazione
 - D. decontaminazione – disinfezione – sterilizzazione
- 16. Le complicanze della Nutrizione Enterale possono essere:**
- A. metaboliche
 - B. gastroenteriche
 - C. meccaniche
 - D. tutte le precedenti
- 17. Per quale delle seguenti patologie è indicato l'utilizzo di un ventilatore CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)?**
- A. Insufficienza renale
 - B. Ipertensione arteriose
 - C. OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)
 - D. Asma bronchiale
- 18. Vomito, dolore, distensione addominale, alvo chiuso a feci e gas sono segni e sintomi di:**
- A. litiasi renale
 - B. occlusione intestinale
 - C. infarto cardiaco
 - D. nessuna delle precedenti

19. Il PICC è:

- A. un catetere periferico ad inserimento centrale
- B. un catetere centrale ad inserimento periferico
- C. un catetere centrale ad inserimento centrale
- D. una tipologia di catetere vescicale

20. La tracheotomia è indicata:

- A. nelle intubazioni prolungate (almeno 7 -10 giorni)
- B. in assenza o anomalità dei riflessi glottici
- C. nelle anomalie congenite delle vie aeree superiori
- D. tutte le precedenti

21. Quale tra i seguenti gruppi sono gli elementi da valutare in condizioni di emergenza/urgenza nel BLS (Basic Life Support)?

- A. favella, motilità agli arti, diuresi
- B. stato di coscienza, diuresi nelle 24 ore, drenaggi
- C. stato di coscienza, pervietà delle vie aeree, respiro e circolo
- D. sodiemia, kaliemia, calcemia

22. Qual è la prima, spesso risolutiva, manovra da eseguire in caso di paziente con ostruzione parziale delle vie aeree?

- A. manovra di Heimlich
- B. dare da bere a piccoli sorsi
- C. favorire ed incitare il paziente a tossire
- D. eseguire subito l'RCP

23. Individua il comportamento corretto dell'infermiere, se il paziente ha un agito aggressivo:

- A. assumere un atteggiamento aggressivo
- B. adottare subito la contenzione fisica
- C. fargli capire chi è il più forte
- D. mostrarsi calmi, prendendo le indispensabili misure di sicurezza

24. Se un paziente riferisce la presenza di aura, si deve pensare che sia prossima l'insorgenza di:

- A. attacco di panico
- B. depressione
- C. crisi epilettica
- D. dolore retrosternale

25. La capacità di individuare i soggetti in cui il fenomeno è presente sul totale di soggetti interessati dal fenomeno stesso, si definisce:

- A. rigidità
- B. abilità
- C. sensibilità
- D. morbilità

26. Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019 all'art. 4 sancisce che:

- A. il tempo di relazione è tempo di cura
- B. il tempo di assistenza è tempo non retribuito
- C. il tempo di relazione non è tempo di cura
- D. nessuna delle precedenti

27. Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019 all'art. 33 sancisce che:

- A. l'infermiere non è responsabile della redazione della documentazione clinica di competenza
- B. l'infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza
- C. l'infermiere è responsabile della conservazione della documentazione clinica di competenza
- D. nessuna delle precedenti

28. I "Farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione", secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 7 del Marzo 2008, sono quei farmaci che richiedono particolare attenzione nella gestione ed uso a causa:

- A. della potenziale tossicità
- B. del basso indice terapeutico
- C. dell'alta possibilità di interazione
- D. tutte le precedenti

29. Quali sono i principali fattori di rischio intrinseci per la prevenzione delle cadute identificati dalla Raccomandazione del Ministero della Salute n. 13 aggiornata al 1 Dicembre 2011:

- A. Età \geq 65 anni, anamnesi positiva per precedenti cadute, incontinenza, deterioramento stato mentale
- B. Età \leq 65 anni, anamnesi positiva per precedenti cadute, incontinenza, deterioramento stato mentale
- C. Età \geq 85 anni, incontinenza
- D. Età \leq 65 anni, anamnesi negativa per precedenti cadute, deterioramento stato mentale

30. La legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie":

- A. sostituisce la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" con "professione sanitaria"
- B. abroga il regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale (D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225)
- C. rende equipollenti i diplomi e attestati conseguiti in borse alla precedente normativa ai diplomi universitari
- D. tutte le precedenti

DOMANDA DI RISERVA

31. La VAS (Visual Analogue Scale) è una scala di valutazione usata per misurare:

- A. la pressione arteriosa
- B. la frequenza cardiaca
- C. la SpO₂
- D. il dolore

ASST SETTE LAGHI

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE CAT. D

PROVA **B**

- 1. In riferimento al posizionamento delle derivazioni precordiali durante l'esecuzione dell'ECG (Elettro Cardio Gramma), la V4:**
 - A. va posizionata nel quinto spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclaveare
 - B. va posizionata nel quinto spazio intercostale sinistro sulla linea ascellare anteriore
 - C. va posizionata nel quinto spazio intercostale destro sulla linea ascellare media
 - D. va posizionata nel quarto spazio intercostale destro lungo la linea parasternale

- 2. Il volume residuo polmonare è di circa:**
 - A. 400 - 500 ml
 - B. 700 - 900 ml
 - C. 2000 - 2500 ml
 - D. 1200 - 1500 ml

- 3. Al momento del ricovero presso il reparto di Medicina, l'Indice di Braden del signor Rossi Mario, di 83 anni, è pari a 6. Quale condizione di rischio corrisponde alla situazione dell'assistito preso in carico?**
 - A. mobilità parzialmente ridotta, cammina occasionalmente e trascorre la maggior parte del tempo a letto o sulla sedia, stato nutrizionale adeguato, occasionalmente presenta incontinenza urinaria
 - B. autonomo negli spostamenti, riesce ad attendere personalmente alla cura della propria persona, stato nutrizionale eccellente, necessità di una supervisione minima da parte del personale infermieristico
 - C. mobilità ridotta, stato adeguato, lievi deficit sensoriali, presenta incontinenza urinaria
 - D. completamente allettato, con scarsa o assente risposta agli stimoli dolorosi. Incontinente, stato nutrizionale inadeguato, supporto con terapie reidratanti per via endovenosa

- 4. Per eseguire un'anestesia peridurale, quale tipologia di ago si può utilizzare?**
 - A. ago di Tuohy
 - B. ago da biopsia
 - C. ago a farfalla
 - D. ago cannula

- 5. Identifica tra le seguenti l'opzione corretta:**
 - A. le maschere FFP3 sono inefficaci contro virus
 - B. le maschere FFP3 ed FFP2 hanno eguali capacità di filtrazione
 - C. le maschere FFP3 garantiscono una filtrazione maggiore del 95%
 - D. tutte le affermazioni sono corrette

- 6. La melena è:**
 - A. presenza di sangue rosso vivo nelle feci
 - B. copioso sanguinamento rettale
 - C. evacuazione di feci purulente
 - D. nessuna delle precedenti

- 7. Un paziente adulto si definisce oligurico se la quantità di urine escrete nelle 24 ore è inferiore a:**
 - A. 1000-1100 ml
 - B. 1400-1600 ml
 - C. 400-500 ml
 - D. 0-100 ml

8. La NRS (Numerical Rating Scale) è una scala di valutazione usata per misurare:

- A. la pressione arteriosa
- B. la frequenza cardiaca
- C. la SpO₂
- D. il dolore

9. In condizioni di normalità, il range fisiologico di riferimento per la SpO₂ è:

- A. tra l'88% e il 95%
- B. maggiore del 95 %
- C. sempre inferiore al 5%
- D. 16-20 atti/minuto

10. Per l'effettuazione dell'esame di urinocoltura, è necessario prelevare un campione:

- A. da mitto intermedio
- B. da primissimo mitto
- C. subito prima di dormire
- D. dopo un pasto abbondante

11. Per emiparesi si intende:

- A. l'incapacità di riconoscere i volti
- B. la visione sdoppiata di un oggetto singolo
- C. perdita parziale della funzione motoria di una metà del corpo
- D. la difficoltà ad urinare

12. Il pericardio è:

- A. una membrana sierosa che avvolge intimamente il cuore
- B. una membrana sierosa che avvolge intimamente i polmoni
- C. una membrana sierosa che avvolge intimamente gli organi addominali
- D. una membrana sierosa che avvolge intimamente il fegato

13. In condizioni fisiologiche, il valore della Kaliemia (potassiemia):

- A. è di circa 8,5-10,0 mEq/L
- B. è di circa 0-3,0 mEq/L
- C. è di circa 135,0-145,0 mEq/L
- D. è di circa 3,5-5,0 mEq/L

14. Al signor Mario Rossi si deve somministrare Gentamicina 80 mg per via intramuscolare. Si ha a disposizione una fiala di Gentamicina da 80 mg/2 ml, quanti ml devono essere prelevati?

- A. 0,5 ml
- B. 1 ml
- C. 4 ml
- D. 2 ml

15. La sterilizzazione è:

- A. processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore
- B. un processo atto alla distruzione dei soli microrganismi patogeni
- C. un processo atto all'abbassamento della carica microbica da oggetti e superfici
- D. nessuna delle precedenti

16. Una donna di anni 63, obesa, presenta ulcera malleolare poco profonda ma molto essudante, accompagnata da edema e iperpigmentazione cutanea. Molto probabilmente ci troviamo di fronte:

- A. ulcera gastrica
- B. ulcera venosa
- C. ulcera peptica
- D. ulcera aftosa

17. Nelle Sindromi delle apnee ostruttive del sonno il paziente manifesta una serie di sintomi. Quale, tra quelli sotto riportati, NON è tipico di tale patologia?

- A. astenia
- B. cefalea al risveglio
- C. diarrea
- D. ipersonnia

- 18. Per evitare la dislocazione d'anca in un paziente sottoposto a intervento chirurgico di protesizzazione totale, è necessario:**
- A. istruire il paziente ad assumere l'abduzione delle gambe e non flettere l'anca interessata oltre i 90°
 - B. posizionare un cuscino tra le gambe durante il sonno e la mobilizzazione nel letto
 - C. non assumere il decubito laterale omologo alla sede di intervento fino a che non ci sia indicazione del clinico
 - D. tutte le precedenti
- 19. Per "ernia" si intende:**
- A. la fuoriuscita di un viscere dalla cavità che normalmente lo contiene
 - B. un processo purulento localizzato
 - C. una forma di peritonite
 - D. un processo osseo vertebrale
- 20. L'algoritmo BLS (Basic Life Support), nell'adulto, comprende compressioni toraciche e insufflazioni d'aria in un rapporto:**
- A. 30:2
 - B. 25:5
 - C. 15:2
 - D. 20:2
- 21. In riferimento al BLS (Basic Life Support), se effettuando una corretta valutazione accerti che la vittima ha circolo e sta respirando normalmente ma è ancora incosciente, fai adottare la posizione:**
- A. seduta
 - B. laterale di sicurezza
 - C. semi-seduta
 - D. prona
- 22. Cosa si intende per "Sincope"?**
- A. perdita improvvisa dell'appetito
 - B. difficoltà respiratoria grave, necessità di ossigeno ad alti flussi
 - C. improvvisa e completa perdita di coscienza
 - D. difficoltà grave alla deglutizione
- 23. Che cos'è il Mini Mental State Examination (MMSE)?**
- A. uno strumento per la valutazione della risposta alla terapia anticonvulsivante
 - B. una scala di valutazione delle complicanze immediate di trauma cranico
 - C. una scala validata per la valutazione dello stato di stress nei caregiver
 - D. uno strumento per la valutazione delle alterazioni cognitive
- 24. Cosa significa la sigla RCT?**
- A. è l'acronimo inglese che significa studio clinico randomizzato e controllato (Randomized Controlled Trial)
 - B. Randomizzazione Controllata e Testata
 - C. è l'acronimo inglese che significa gruppo di ricerca clinico (Research Clinical Team)
 - D. Rischio Clinico Teorico
- 25. Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019 all'art. 8 sancisce che l'infermiere, nei diversi ruoli, si impegna attivamente nell'educazione e formazione professionale:**
- A. solo degli operatori di supporto
 - B. degli studenti e nell'inserimento dei nuovi colleghi
 - C. del personale di supporto, ma non dei nuovi colleghi
 - D. dei volontari e dei caregiver
- 26. Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019 all'art. 35 sancisce che:**
- A. l'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico
 - B. l'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico
 - C. l'infermiere riconosce che la contenzione è esclusivamente un atto medico
 - D. nessuna delle precedenti
- 27. Quale acronimo, secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n.12 dell'Agosto 2010, è utilizzato per indicare quei farmaci che possono essere facilmente scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome e/o per l'aspetto simile delle confezioni?**
- A. LOSA
 - B. LESO
 - C. LISI
 - D. LASA

28. La valutazione del rischio di caduta di un paziente di età superiore a 65 anni, secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 13 aggiornata al 1 Dicembre 2011, deve essere effettuata:

- A. all'ammissione in reparto e obbligatoriamente ad ogni turno
- B. all'ammissione in reparto, a intervalli regolari nei ricoveri prolungati, a seguito di un episodio di caduta, dopo una variazione della terapia farmacologica, alla dimissione
- C. solo a seguito di un episodio di caduta
- D. solo alla dimissione

29. Gli Organi degli Ordini delle Professioni Sanitarie previsti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", sono:

- A. Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti
- B. Presidente, Consiglio Direttivo, Commissione d'Albo, Collegio dei Revisori
- C. Amministratore delegato, Consiglio dei Sanitari, Collegi Tecnici
- D. Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale

30. Alla figura dell'Operatore Socio Sanitario è possibile:

- A. attribuire compiti semplici e ripetibili inerenti il mansionario specifico
- B. delegare compiti e mansioni
- C. assegnare la somministrazione della terapia
- D. delegare compiti e valutazione delle attività svolte

DOMANDA DI RISERVA

31. Quali sono i valori normali della Frequenza Cardiaca in un adulto sano a riposo?

- A. 120-150 battiti/min
- B. 3-6 battiti/min
- C. 20-30 battiti/min
- D. 60-100 battiti/min

ASST SETTE LAGHI

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE CAT. D

PROVA C

1. In caso di ipoglicemia marcata si avranno, tra gli altri, i seguenti sintomi:

- A. sudorazione, emesi, dolore toracico, astenia
- B. sudorazione, bradicardia, oliguria, cefalea, coma iperosmolare
- C. sudorazione, pallore, mialgia, fibrillazione atriale, astenia
- D. sudorazione, tachicardia, obnubilamento del sensorio, capogiri, astenia

2. Da quante coppie di nervi cranici è composto il sistema nervoso periferico?

- A. 5
- B. 12
- C. 8
- D. 15

3. La "catena della sopravvivenza" consta, in sequenza, delle seguenti fasi:

- A. RCP precoce, Valutazione dello stato della cute, soccorso vitale avanzato, diuresi e natremia
- B. defibrillazione precoce, trasporto avanzato, allerta precoce del sistema di soccorso di emergenza/urgenza e soccorso vitale
- C. allerta precoce del sistema di soccorso di emergenza/urgenza, RCP precoce di alta qualità, defibrillazione precoce, trasporto e soccorso vitale avanzato
- D. trasporto avanzato precoce, RCP precoce, allerta precoce del sistema di soccorso di emergenza/urgenza, defibrillazione precoce

4. Per eseguire una paracentesi, quale tipologia di ago si può utilizzare?

- A. ago da biopsia
- B. ago a farfalla
- C. ago di Verres
- D. ago cannula

5. Per prevenire le lesioni da pressione è necessario:

- A. fare continue applicazioni caldo-umide
- B. effettuare massaggi con soluzione a base alcolica
- C. effettuare la cura della cute con antisettici specifici
- D. mantenere la cute pulita ed asciutta

6. Quale dei seguenti interventi è importante nella persona con difficoltà di deglutizione?

- A. igiene del cavo orale
- B. somministrazione di bevande dolci
- C. somministrazione di alimenti a doppia consistenza
- D. tutte le risposte sono corrette

7. Un paziente adulto si definisce anurico se la quantità di urine escrete nelle 24 ore è inferiore a:

- A. 400-500 ml
- B. 0-100 ml
- C. 1000-1100 ml
- D. 1400-1600 ml

8. Uno degli strumenti che permette la valutazione del rischio cadute è la scala di:

- A. Braden
- B. Barthel
- C. Glasgow
- D. Conley

9. Il Barthel Index valuta:

- A. le attività di vita quotidiana
- B. il rischio di cadute
- C. i disturbi comportamentali
- D. lo stato cognitivo

10. L'ascite è:

- A. una condizione di accumulo patologico di liquido all'interno della cavità cerebrale
- B. una condizione di trombosi agli arti inferiori
- C. una condizione di litiasi renale
- D. una condizione di accumulo patologico di liquido all'interno della cavità addominale

11. Per anisocoria si intende:

- A. la visione sdoppiata di un oggetto singolo
- B. l'incapacità di esprimersi mediante l'uso della parola
- C. la difficoltà ad urinare
- D. la presenza di pupille con dimensioni tra loro diverse

12. Il peritoneo è:

- A. una membrana sierosa che avvolge i polmoni
- B. una membrana sierosa che avvolge gli organi addomino-pelvici
- C. una membrana sierosa che avvolge il cuore
- D. una membrana sierosa che avvolge il mesencefalo

13. Nell'uomo adulto sano, il valore dell'emoglobina nel sangue:

- A. è di circa 7-10 g/dl
- B. è di circa 42-52 g/dl
- C. è di circa 135-145 g/dl
- D. è di circa 14-18 g/dl

14. Si deve somministrare come profilassi antibiotica al signor Mario Rossi Gentamicina 60 mg per via intramuscolare. Si ha a disposizione una fiala di Gentamicina da 80 mg/2 ml, quanti ml devono essere prelevati?

- A. 0,5 ml
- B. 1,5 ml
- C. 2 ml
- D. 4 ml

15. Quale metodo NON può essere utilizzato per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico:

- A. a fiamma ossidrica
- B. a vapore
- C. ad ossido di etilene
- D. a gas plasma di perossido d'idrogeno

16. Un uomo di 78 anni presenta ulcera profonda e molto dolorante a livello della caviglia; le estremità sono fredde e cianotiche. Molto probabilmente ci troviamo di fronte:

- A. ulcera gastrica
- B. ulcera arteriosa
- C. ulcera peptica
- D. ulcera aftosa

17. Nella lettera di dimissione di un paziente allettato è riportata la presenza di una lesione da pressione al 3° stadio: a cosa corrisponde?

- A. iperemia che non scompare alla digitopressione
- B. lesione cutanea a spessore totale con degenerazione e/o necrosi del sottocutaneo
- C. zona iperemica con presenza di vesciche sierose
- D. necrosi tissutale profonda, con interessamento muscolare e/od osseo

18. In un paziente con apparecchio gessato a un arto, quali segni e sintomi si devono monitorare all'estremità interessata al fine di prevenire danni alla funzionalità neurovascolare?

- A. colorito cutaneo
- B. temperatura cutanea
- C. presenza di dolore e/o parestesie
- D. tutte le precedenti

19. Nella Glasgow Coma Scale un punteggio inferiore a 7 indica:

- A. coma
- B. sonnolenza
- C. stato di completa vigilanza
- D. nessuna delle precedenti

20. Lo shock ipovolemico, può essere causato da:

- A. miocarditi, alterazioni valvolari cardiache, embolie polmonari
- B. emorragie massive, disidratazione ed ustioni di grave entità
- C. batteri della classe MRSA (Staphylococcus Aureus Meticillino-Resistente)
- D. allergeni

21. L'angina pectoris è:

- A. una scarsa irrorazione cerebrale e scarsa ossigenazione dovute a cause diverse: anemia, ipotensione, digiuno, temperatura eccessiva, permanenza in ambienti mal areati, traumi fisici e psichici, dolore, fatica prolungata, stazione eretta in soggetti ipotesi
- B. una condizione di occlusione degli alveoli polmonari, tale da causare insufficienza respiratoria
- C. una condizione dovuta ad un'alterazione patologica arterio\atero-sclerotica, temporanea costrizione delle arterie coronarie che si manifesta con dolori in sede precordiale di durata relativamente breve
- D. tutte le affermazioni sono corrette

22. Nelle ustioni da caldo/calore di secondo grado, si avrà:

- A. formazione di vescicole (flittene) ripiene di liquido incolore
- B. necrosi del tessuto, con formazione di cicatrice deturpante, che può estendersi anche al tessuto ipodermico ed è caratterizzata dalla mancanza di sensibilità a causa della lesione delle terminazioni nervose periferiche
- C. eritema cutaneo o arrossamento
- D. cianosi diffusa

23. Il delirium è:

- A. uno stato di insonnia cronico
- B. un disturbo acuto e reversibile dell'attenzione, dello stato cognitivo e del livello di coscienza
- C. uno stato di depressione post-partum
- D. nessuna delle precedenti

24. L'Evidence Based Nursing (EBN) è:

- A. una teoria secondo la quale l'assistenza infermieristica deve basarsi solo sull'esperienza maturata in reparto
- B. un approccio metodologico attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristica erogate sono basate su prove di efficacia
- C. un approccio attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristica erogate sono basate sulle indicazioni del collega più esperto
- D. nessuno delle precedenti

25. Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019 all'art. 18 sancisce che

- A. l'infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell'assistito durante il percorso di cura
- B. l'infermiere rileva il dolore dell'assistito durante il percorso di cura, ma non è necessario che lo documenti
- C. l'infermiere previene e rileva il dolore dell'assistito solo durante le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive
- D. l'infermiere rileva e documenta il dolore solo su richiesta dell'assistito

26. Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019 all'art. 36 sancisce che: "l'infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale, , per la sicurezza dell'assistito, l'attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati"

Completare lo spazio libero nel testo, indicando l'opzione corretta tra le risposte seguenti.

- A. pianifica, coordina, ma non verifica
- B. programma, supervisiona, corregge
- C. pianifica, supervisiona, verifica
- D. programma, coordina, supporta

27. Per evitare errori di terapia dovuti allo scambio di farmaci LASA, secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n.12 dell'Agosto 2010, tali farmaci devono essere conservati:

- A. separatamente, solo negli armadi della Farmacia
- B. separatamente, sia negli armadi che sul carrello della terapia
- C. insieme agli altri farmaci sia negli armadi che sul carrello della terapia
- D. insieme agli altri farmaci

28. Quali sono, secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 17 del Dicembre 2014, i cosiddetti momenti di Transizione di Cura in cui è essenziale effettuare una revisione accurata dei medicinali assunti dal paziente per ridurre il rischio di errori in corso di terapia farmacologica?

- A. il ricovero e la dimissione del paziente in ospedale
- B. il trasferimento del paziente tra reparti della stessa struttura
- C. il trasferimento del paziente in un'altra struttura ospedaliera o extraospedaliera
- D. tutte le precedenti

29. La legge 11 gennaio 2018, n. 3 "delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" costituisce:

- A. l'OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche)
- B. l'AICO (Associazione Italiana degli Infermieri di Camera Operatoria)
- C. l'ANIN (Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze)
- D. la CNAI (Consociazione Nazionale delle Associazioni infermiere/i)

30. Per caduta, secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 13 aggiornata al 1 Dicembre 2011, si intende:

- A. un improvviso spostamento verso l'alto dalla posizione seduta
- B. un improvviso, non intenzionale, inaspettato spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica o assisa o clinostatica
- C. un voluto e intenzionale spostamento verso il basso dalla sola posizione ortostatica
- D. nessuna delle precedenti

DOMANDA DI RISERVA

31. Per piuria si intende:

- A. urine con presenza di pus
- B. urine ematiche
- C. urine normocromiche
- D. nessuna delle precedenti