

الحياة تستمرة

معلومات للمريض لزراعة الكلية

مقدمة

كلاويك لا تعمل كما يجب : لهذا هقترح عليك زرع الكلية لعلاج مرضك

اكثر المرضى يتاملون في امكانية الزرع ولكن هذا يسبب لهم قلق زرع الكلاوى الان اصبح احسن علاج لمرضى الكلاوى
كت يوم في جميع العالم زرع الكلاوى يعطى لمئات الاشخاص حياة جديدة مليئة بحيوية ونشاط

نجاح زرع الكلى كثراً بالنسبة للماضى
اليوم شakra على تقدم الطب ولعلاج الحماية من الطرد الرفض ولطرق الجراحة اكثر المزروعين متفائلين بان وظائف الكلى ت العمل لسنين عديدة وطويلة

هذا الدليل يعطى معلومات تساعد في معرفة كل ما يلزم حسب تعليمات الطبيب المعالج يعطى اجوبة لكل سؤال وللأى قلق هو شكل

هذا الدليل يعطى للمريض الامكانية بأن يكون عنده معلومات كافية ليساعد في الشفاء مع مساعدة الطبيب والممرضون الذين يعالجوه

2. الكلاوي

في جسم الانسان توجد كليتان موجودتان خلف الظهر الكلاوي هم فلتر لتصفية الجسم. ينقيان الدم الذي نصل من شرايين الكلوي لينظفوه من المواد السامة مثل لوريه (AZOTEMIA) وكرياتينين. طعامنا يحتوي على عدة انواع من الاملاح المعدنية ضرورية للصحة. مع هذا إن كمية هذه الاملاح التي تدخل وتفيد الجسم. الكلوي تقوم بخلص الجسم من الكمية الزائدة بواسطة البول.

- للكلاوي توجد اهمية مهمة لحاجات أخرى فإنه تبرز هرمون الذي ينظم ضغط الدم.

- ينتج ERITROPOIETINA (هرمون الذي ينشط النخاع العظمي) والإنتاج كريات الدم الحمراء، مهمة لنقل الأكسجين.

- كما تنتج فيتامن "د" مهم للعظام.

3. عدم كفاءة عمل الكلاوي

المزمن مع مرور الوقت تؤدي الكلاوي وتسبب ضرر كبير بدون امكانية للشفاء.

توجد نوعان من قصر عمل الكلاوي.

- قصر عمل الكلاوي الحاضر يحصل بأصابة مفاجئة من الممكن ان يتوقفوا عن وظيفتهم لمدة قصيرة وبعد ذلك يعودوا للعمل بصورة جزئية او كاملة.

- بالنسبة لقصر عمل الكلاوي المزمن يلحق ضرر بدون اي امكان للشفاء هذا مع مرور السنين. قد يكون السبب التهاب او من الجهاز الويقائي، مرض السكري او من ضغط الدم المرتفع او من امراض وراتية.

- عندما لا تشتعل الكلاوي بصورة كاملة يتوقفوا عن عمل.

عوارض لقصر عمل الكلاوي

بعض الاشخاص يشعرون بهبوط. تعب من جهد قليل، لا يوجد عندهم رغبة للاكل وطعم للاكل مختلف. توجد عوارض أخرى مثل الحك. البول قليل وحاجة للتبويل بالليل.

٤. زرع الكلاوي

عندما يكون ضروري زرع كلية جديدة يجب اقامة عدة فحوصات وتقدير امكانية الزرع. يوحد اسم المريض مع كل فحوصاته بهذا يدخل بقائمة انتظار الزرع في مدينة فاريزي. (البرنامج هذا هو من شمال إيطاليا).

مدة الانتظار قد يأخذ بين سنة او سنتين هذا يتوقف على امكانية المتطوعين وموافقتهم بين بعض. في هذه الفترة يجب عدم التدخين. نقص الوزن اذا كان الوزن مرتفع، مراجعة طبيب الاسنان.

A. الاستعداد للدخول المستشفى.

في فترة الانتظار يجب عن يكون الشخص جاهز. باعطاء مركز زرع الكلاوي ارقام تلفون شخصي وبان يكون حاضر دائمًا التلفون مضوي شاغل.

يجب ان تعرفوا بان توافر الكلى تخبر باقل من 12 ساعة، خصوصا للذين يسكنون بعيد عن مدينة فاريزي، يجب ان تكون الحقيبة حاضرة مع كل الذى يلزم.

B. عندما يتصل المستشفى بالتلفون، حالا عندما يجدوا عضو للزرع، يخبروا المريض مركز الزرع ويعطيه كل المعلومات الازمة عن ماذا يجب ان يعمل.

ممنوع الأكل او الشرب او اخذ اي دواء غير دوائية المفروض اخذه. اي عارض مثل رشح، قحة، حم، او شيء اخر يجب ان يعلم الطبيب فورا. في هذه الحالة يمكن ان تعطى الكلى لشخص اخر بأسرع وقت.

C. تجهيز للعملية

يجب معرفة إذا كان توجد بعض الموانع، يجب الذهاب للمستشفى (مركز ديناليزي قسم الزرع عندها تعطى له معلومات مهمة) هناك تجرى له عدة فحوصات التي تقرر نوعية الزرع. قبل العملية تقابل المريض مع الجراح والمخدر ليشرحوا كيف ستكون العملية والخطر منها. يتطلب منه امضي على موافقته على العملية وعلى نقل الدم من شخص آخر. ايضاً يوافق على قبول عضو عليه خطر "ليس دائمًا" وإذا وجد عدو متبرع به ملائم. في هذه الحالة يجب عن يوافق بامضائه قبل العملية.

D. العملية

العملية الجراحية تأخذ مدة 3 ساعات تقريبا. كلی الشخص لا تزال عادتا والكلی الجديدة تضع على اليمين او على اليسار في قسم البطن الاسفل. مكان الكلی الجديد يكون سطحي بهذه الصورة يمكن عن تلمس من فوق البطن وبهذه يكون سهل أخذ عينة للفحص.

E. الفترة بعد العملية

- عند الاستيقاظ من التخدير يكون الوضع:
- أنبوب في الوريد كما في كل عملية جراحية. هذا لاعطاء الادويه ضد الطرد (الرفس) و انتيبيوتك ولتبول. الخ.
 - كاتيتر لسحب البول من المثانة (كيس البول) يجب عن يبق لعدة ايام لمراقبة كمية البول عدة مرات.

صوره 2

- الجرح طوله 20 سم ويكون بجانبه كاتيتر لسحب الماء .
- توجد زوندة أنفي معدى حتى تسحب هوامض المعدة ليريح الجهاز الهضمي تبقى الزوندة لمدة 24 ساعة .

حتى تراقب عمل الكلى كما يجب تقام فحوصات مثل إكوجرافية بعد العملية.

F. فحص عينة من الكلى

الاطباء قد تقرر فحص بأخذ عينة من الكلى الجديدة. هذا الفحص يسمى "بيوبسية" يوبيح إذا كان هناك إمكانية للطرد او مشاكل أخرى. هذا يتم في المستشفى: مع تخدير محلي باستعمال ابره دقيقة ويفحصوه على المكابر.

بعد هذا الفحص المرifer يبقى في السرير لمدة 8 ساعات.

G. بعض المرات قد يتعرقل الوضع مبكرا.

تكون من الجراحة: كدمات، نقة دم بالشريان، مجموعة من المصل، فقدان البول او عدوى.

في بعض الحالات تقام عملية جراحية.

وظيفة الكلى يمكن عن لا تبدأ للعمل حالا لعدة مشاكل. هذه المشاكل تدوم من 2-3 اسابيع لهذا تعمل الدياليز.

H. الطرد (الرفض)

من ناحية الجسم لا تقبل العضو الجديد لانه يعتير "غريب" وهكذا يتم حالة الطرد العضو نفسه وفي هذه الحالة قد تظهر في اي وقت بعد الزرع.

يمكن التغلب عليها بعلاج خاص ضد الطرد. في حالات نادرة الطرد بدون اي علاج يجلب فقان العضو وإزالته.

I. مراجعة الطبيب

إذا لم تكن مشاكل يبقى المريض في المستشفى 12-20 يوم . بعدها تكونوا مربوتين بالمستشفى لكل صعوبة .

في البداية تكون المرقبة في اوقات متقاربة يقام للمربي فحص بول ودم وتقام له صورة الشعة .

مهم جدا

- لا تأخذ ادوية ضد الطرد قبل ان تعمدوا فحص الدم لانه يغير نتيجة الفحص.
- كل زيارة للمراجعة يجلبوا معكم قائمة الادوية لمتابعة العلاج .

5. يمكن حدوث تعرقل متأخر

الطرد

.A

الادوية تمنع طرد الكلى في اغلب الحالات باعطاء كمية كبيرة من الادوية عن السابق .

اعراض الطرد

غالبا اعراض للكرد قليلة مثل الشعور بحالة ضعف. ارتفاع درجة الحرارة قليلا لكن تجد اعراض مهمة اكتر مثل

- ارتفاع الوزن خلال 24 ساعة

- ورم عظم الكعب

- تقل كمية البول في 24 ساعة

- رفع ضغط الدم

- صعوبة التنفس لاقل عمل او حركة

- وجع من ناحية الكلى المزروع

- درجة حرارة 38 او اكتر خصوصا في الصباح كل هذا يجب اخبار الطبيب حالا في قسم الزارع.

لا تخافوا: اكتر من 90% لهذه الحالة للطرد يسيطر عليه باعطاء ادوية والكلى ترجع لوظيفتها الطبيعي.
اكثر الحالات لا تحتاج الى البقاء في المستشفى.

العدوى

.B

يمكن بأن المريض عنده استعداد اكتر للعدوى بسبب دوائى المنعه ضد الطرد.

بعض العدوى يكون سببها من العضو المزروع (من المتبرع) قد تأتى من فايروس او من الميكروبات التى تكون في الجسم تحول الى التهاب او من المستشفى.

بعد الزرع يعطى الانتبيوتوك للوقاية من العدوى والالتهاب تعطى لمدة 3 - 6 شهر من تاريخ الزرع.

خلال المراجعة عند الطبيب تقام فحوصات روتينية (مثل فحص الدم ورُزْع البول) التي تعطي امكانية لأخذ ضد العدوة.

• مرض السكري .C

المعروف بان مرض السكري يكون بارتفاع كمية السكر في الدم. بعض ادوية جهاز المناعة تسبب السكري. يجب بهذه الحالة اخبار الطبيب.

- الاحساس بالعطش
- التبويل الكثير
- انزعاج في النظر
- عدم التركيز

إذا أصاب بالسكري يجب معالجته. يجب تخفيف الوزن. اتباع حمأة خاصة وعمل رياضة مع امكانية استعمال الانسولين.

• ضغط الدم المرتفع .D

- يجب على الشخص الذي زرع له عضو ان يأخذ ادوية لضغط الدم

- تغير مناج الحياة
- تجنب القلق و اخذ راحتك
- قلل من الملح
- عدم التدخين
- عمل رياضة منتظمة
- اتباع الحمية الم موضوعة من قبل الطبيب

E. الاورام

الدوية جهاز المناعة مع مرور الوقت يزيدوا الامكانية من تنمية الاورام : في الخلايا الليفافية والجلد نسبة الخطر قليلة (اقل من 3%) يجب على المريض عمل الفحوصات دائمًا . عندما تشعر بتغير بالصحة يجب ان تتجاء للطبيب باسرع وقت .

كما يجب ان تتجنب اشعة الشمس للحماية من سرطان الجلد .

مضغفات عصبية

.F

بعض ادوية جهاز المناعة تسبب حالات عصبية دوائية اسمه CICLOSPORINA و tacrolimus يسببا قلق وكابوس واحيانا بغيرات في الحالة النفسية. يشعرون برعشة والنسيان وتنميل في الارجل. تقل هذه الاعراض مع تخفيف كمية الدواء.

مشاكل عقلية وعصبية

.G

بعد مرور الفترة الاولى من الفرح تأتي بعدها فترة اكتئاب وقلق من خوفهم على حالتهم الصحية.

بعض منهم يخاف مقابلة اشخاص ويختبئوا لخوفهم من العدوا وبان يرجعوا لأخذ الدياليزى في هذه الحالة وايضا ، لرجوعهم للعمل. الممرضات والاكياء قد يساعدونهم.

6. ادوية جهاز المناعة للطرد

الهدف لهذه العلاج المختص بالوقاية يمنع الطرد باعطاء عادتا عدة ادوية تأخذ بصورة منظمة بعضها طول الحياة وبعضها لمدة قصيرة او تزاح بعد الزرع.

علاج الاستقراء

.A

BASILIXIMAB (SIMULECT®), TYMOGLOBULINE

تأخذ هذه الادوية مع ادوية جهاز المناعة مثل CICLOSPIRINA و CORTICOSTEROIDI . تأثيرات جانبية مثل مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الاسهال والقئ والتهاب الجرح.

العلاج الوقائي

.B

(®CICLOSPORINA (SANDIMMUN®, NEORAL®), TRACROLIMUS (PROGRAF

هذه الادوية تعتبر ذات اهمية لتعالج جهاز المناعة تاخذ عادتا عن طريق الفم مع هدا الايام حالا بعد الزرع يمكن ان تاخذ هزة الادوية عن طريق الوريد اتمريض يكون دائما تحت مراقبة نعمل فحوصات للدم والوقاية من العوارض الجانبية

ciclosporina تكون ملائمة وتحسب حسب وزن الشخص كمية

وتحسب الفحوصات المختبر

. يجب اخذ هذه الادوية مرتين في اليوم كل 12 ساعة تماما

يوم المراجعة عند الطبيب يجب اخذ الدواء ساعتين قبل فحص الدم .
. يجب ان تجلبوا معكم كل الادوية لاخذها فورا بعد الفحص

حبات الدواء يجب ان تبلغ فورا بعد اخذها من العلبة وتشرب مع سائل او عصير ليس عصير الكريں فوت

تحذيرات

هذا الدواء ياثر سلبيا مع اخذ ادوية اخرى عاديـة لهذا يجب اخبار Ciclosporina الطبيب دائمـا

. عن اي دواء تقوم بتناولـه

ايضا كمية الدواء تحسب حسب وزن الشخص وعلى تركيز الدواء في . الدم وحسب الحالة الصحية هذا يرجع لنتائج الفحوصات

. وعلى وجود اي عوارض جانبية للدواء

الكمية اليومية يجب ان تأخذ مرتين كل 12 ساعة ، يجب ان تأخذ حبة الدواء فورا من العلبة وبلغها حالا مع الكثير من الماء ، الدواء يجب ان يأخذ بعيدا عن الاكل على الاقل ساعة قبل او بين 2-3 ساعات . بعد الاكل

يوم المراجعة عند الطبيب لا تأخذوا دواء

. tacrolimus

حتى بعد اخذ الدم يجب ان تحضرـوا معـكم جميع الـادـويـة . بعد الفـحـص . تـاخـذـ الـادـويـة

عوارض جانبية

عوارض مزعجة

ما العمل ؟

- . شعر على الجسم -----> تصبغ او تزال
- . انتفاخ النيرة -----> علاج الاسنان
- ضغط عالي -----> ادوية لخفض مستوى الضغط من قبل الطبيب
- . تسمم في الكلاوي -----> مراقبة تركيز الدواء
- . رجة -----> يخبر به الطبيب
- . سكري -----> يعطى الانسولين

Corticosteroids , prednisone , metilprednisolone (deltacortene (R) , urbason (R) medrol (R)

تعطى هذه الادوية عادة مدى الحياة بقيمة خفيفة لمنع رفض العضو المزروع ، اما الكمية الاكبر (صفحة 13) تعطى لمدة قصيرة لنفس

الغاية الكورتيزون تعطى عادة مع دواء المناعة مثل

Ciclosporina tacrolimus

كمية الكورتيزون تحسب حسب حسب وزن المريض وحسب المدة التي مرت على الزرع .

اخذ الحبوب خلال وجبة الاكل : هذا اذا كان تأخذه مرة في اليوم ،
• افضل تناوله مع الفطور

تأثيرات غير مرغوبة

ارتفاع الوزن مع توزيع الشحم على الجسم بطريقة غريبة
• حماة قليلة ملح وقليل سكر

وذمة وانتفاخ الاطراف
• قليل من الملح

حرقة بالمعدة
دواء ضد الحموضة وضد جرح

. المعدة

زيادة الشهية للطعام

. نصيحة للمعدة

حبوب وحب الشباب

. علاج جلدي

تطور نفسي وقلق

. ادوية مهدئة من قبل الطبيب

تأثيرات جانبية

تأثيرات جانبية تأتي مع الوقت

: ضعف في العظم وفي العضل*

. زيادة في الوزن*

. ارتفاع ضغط الدم*

. الجلد يتغير ويصيبه كدمات*

. ازعاج معدة وامعاء مثل حرقة وجراح*

. مرض سكري*

. كثارات العين*

* ظهور حبوب على الوجه وشعر .

الكمية للدواء تحسب حسب الوزن والحاله الطبيه وحسب الوقت الذي

. مضى للزرع

يمكن اخذ الدواء في اي وقت خلال اليوم ولكنه ينصح بان يتبعو

. المريف على تناوله في نفس الموعد

تعطى (ACIDO MICOFENOLECE) (cell-cept) (R) Micofenolato mofetile

. من المستشفى هذه الادوية بمناسبه زيارة المرague

ينصح بان توخذ هذه الادوية على الاقل ساعة قبل الاكل وبين 2-3 ساعات

. بعد الاكل

تأثيرات جانبية

. تناقص الكريات الدم البيضاء في الدم

. تظهر علامات فقر الدم

. تساقط الشعر

. ترتفع درجة الحرارة

. الم في المفاصل

. تغير في وظيفة الكبد

خلال فترة المرض هناك شعور باللعي في المعدة و الاسهال

. هذه العوارض تخف مع تقليل كمية الدواء

RAPIMICINA (SIROLIMUS (R) RAPAMUS (R)) مفيدة كثيرة لمناعة الرفض

بدون ان تؤذى الكلى نفسها ولكن توجد تأثيرات جانبية اخرى مثل :

ارتفاع الكوليسترونول

نقص الصفائح الدموية

اسهال

وجع في المفاصل

. الجروح تحتاج لوقت طويل حتى وصول مرحلة الشفاء

فعالية هذا الدواء تشبه (CERTICAN (R)) EVEROLIMUS

حتى الان يستعمل على شكل كبسولة SIROLIMUS TACROSPERINA الدواء

cicloporima ويأخذ بنفس الوقت مع

كل 12 ساعة والتآثيرات مشابهة لل Sirolimus

. جرب ان تاخذ الادوية كل يوم في نفس الموعد

لا تغير ولا تنسى ان تاخذ الدواء حتى الشعور بالتحسن

اذا حدث هناك خطأ في كمية الدواء في اليوم ذاته يجب اخبار الطبيب

فورا

اذا نسيت تناول الدواء يفضل اخذه حال تذكر بذلك

افحص دائما تاريخ التسويق المكتوب على علبة التسويق

اخبار الطبيب حال وجود اعراض غريبة وجديدة حال حدوثها

حظر استعمال ادوية خارج قائمة الادويه المتبعة

حفظ الادوية بعيدا عن متناول يد الاطفال

لا يجب وضع الادوية في البراد الا في حال وصف الطبيب او الصيدلي

بذلك

التاكد دائما بوجود كيمة الدواء الكافية وخصوصا في العطلة

انتبه من الموافقة بين الادوية

لأنها لا تلائم مع antibiotic استشر طبيب الزرع عند اخذ اي دواء مثل دواء الرفض بذلك تزيد امكانية الرفض وتجلب اعراض جانبية لا تشرب عصير الجريب فروت او اكله لانه يمنع امتصاص الادوية تجنب من اخذ اباريكو او عشبة القديس جوفاني لانه لا يتوافق مع الادوية

كما احذر من ادوية هوموبيتشيا او من وصفات الاعشاب

.قواعد هامة طبية بعد ترك المستشفى 7 .

جماعة الاطباء والممرضات لمركز الزرع يأخذون على مسؤوليتهم . العناية بالمريض بطريقة مستمرة في مدة البقاء في المستشفى لهذا الشخص الذي زرع له عضو يجب ان يكون مسؤول عن صحته . وبان . مركز الزرع دائمًا موجود لمساعدته

A علاج جرح العملية .

حافظ على نظافة الجرح باستعمال صابون خصوصي اذا لاحظت اي تغيير على الجرح مثل ورم او احمرار او اي سائل يخرج . من الجرح يجب اخبار الطبيب حالا

B قم بقياس درجة الحرارة كل يوم لمدة شهرين وكل مرة لطرد ، اذا . وصلت الحرارة ل 38 يجب ان تذهب الى الطبيب الزرع ، لا تأخذ علاج من اي طبيب خارج مركز الزرع

C ضغط الدم والنبيض.

تقوم الممرضة بارشاد حول طريقة استخدام جهاز قياس الضغط والنبيض . من المهم ان يعرف المريض قيمة القياس الطبيعي للنبيض

D مراقبة البول والوزن.

كمية البول التي تعمل في اليوم عندما تقدر قيمة حتى يحدد مدى . فعالية الكلى

يجب ان تقيس وزنك كل يوم في الصباح قبل وجبة الافطار

صوره 4

اذا تبين ان كمية البول اقل والوزن ارتفع 1 كغم في اليوم او 2 . كغم في週الاسبوع ، يجب الاتصال بالطبيب حالا ضروري فحص البول باستمرار ، في بعض الاحيان توجد في البول كمية صغيرة من الدم بعد العملية اذا استمر هذا الوضع اي وجود الدم بالإضافة الى الرائحة الكريهة يجب اخبار الطبيب

E. العناية بالاسنان

تنظيف الاسنان فورا بعد الأكل واستعمال مطهر خصوصي للفم خصوصا اذا . كنت تتضع شدة الاسنان

مهم بان تفحص اسنانك عند الطبيب كل ستة اشهر اذا كانت هناك حاجة .

. اذا كان هناك حاجة بتناول الانتبيوتوك اتصل بعيادة الزرع

F نظافة جسمك.

. مهم جدا ان تعتنى بنظافة الجسم حتى تقل العدوى : اتبع هذه المعلومات الاتية

. اغسل يداك جيدا*

. قص اظافرك واغسلهم بالفرشاة*

لا تستعمل صابون قاس , فقط من سائل موجود في زجاجة , لا تقوم *

. بتعبيئته عند انتهاءه

غير المناشف يوميا وخصوصا التي قمت باستعمالها والتي تعود الى *
• شخص واحد فقط

خلال فترة العادة الشهرية غير النشافة خارجي او اذا كان داخلي *
بطريقة مستمرة ، لأن الدم سريع انتقال للبكتيريا ، لا تستعمل
• صابون مطهر للنظافة الشخصية للمهبل لانها تقضي على خلايا المناعة
• يكفي استعمال صابون سائل ذات ماء و وسط معتمد للحموضة
• اعتنى ب ارجلك وارتدي حذاء مريح

G. العناية بالجلد والشعر.

في بداية الفترة بعد الزرع قد تظهر حبوب صغيرة على الوجه ،
• الرقبة ، مثل حب الشباب
اغلب المرات للحالة تسببها الكورتيزون ، طبيب القسم ينصح بالذهاب
• ل طبيب الجلد
• يجب استعمال كريم مطري حتى تحافظ على تغذية الجلد
الكورتيزون من الممكن ان يشوه منظر الشعر ، الصبغة او الكوي او
• الصبغة لتفتيح لون الشعر ، قد يضعف الشعر

H. نمو الشعيرات على الجلد

. ادوية المناعة الرفض قد تسبب نمو شعر على الوجه
مما يزعج المرأة والطفل ، يمكن ان تستعمل كريم لازالة الشعر او
استعمال الاكسجين تتشقيره
او استعمال السكر (العقيدة) او اي واسطة لازالة الشعر ، استشارة
• الطبيب بنصيحة

I. الجلوس في الشمس

امتنعي عن الجلوس تحت الشمس بين الساعة 10 الى الساعة 15 بعد
• الظهر ، اي عندما تكون اشعة الشمس ساطعة

قومي بوضع القبعة على الراس والبسى ثياب ذات كم طويل حتى تحمي *
من الشمس

استعمل كريم للحماية من الشمس قوة 15 % في الربيع والصيف . *
ضعى الكريم على كل الجسم الذي يكون معرض للشمس خصوصا الوجه

تذكري دائمًا أن الشمس مؤذية ، حتى إذا كانت السماء مغطية بالغيوم*
• لأن شعاع الشمس يعكس على الجسم من الرمل والثلج
• لا تأخذ أشعة السولاريم للاسمراز*

قومي بمراقبة الشامة إذا تغير شكلها ، حجمها ولونها ، التجئي*
• للطبيب في مركز الزرع حالا

I. غسل اليد

غسل اليد يمثل شئ بسيط ولكنه مهم جدا ، ليمנע العدوى ، اتبعو
• هذه النصائح

- قبل وضع اليد على الفم*
- قبل بعد الاكل*
- قبل اخذ العلاج في الفم *
- قبل غسل الاسنان والحلق*
- بعد الدخول للمرحاض*

بعد ان تكونوا قد مسكتو اشياء قذرة مثل الجريدة ، النقود ، *
• الاحذية او اي شئ غير نظيف

• قبل وبعد تغير الحفاض في حالة اطفال*

• بعد ان تمisko الحيوانات ، بيتهما ، اكلهم ، نفاياتهم*

• بعد ان تزرعوا وتقوموا بمسك التراب ، الازهار*

.... بعد تنظيف الانف ، او بعد القحة الخ*

إذا لم تكون امكانية الغسل بالماء ، يجب ان تكون معكم دائمًا*
علبة فوط مبلولة بالكحول ضد الميكروبات في حالة الطوارئ . قم
• بشرائها من الصيدلية

M. دمامل و جروحات في الشرائين

بما ان جرح الفتة لغسل الكلاوي لا تستعمل ، يجب ان تخبروا الطبيب
إذا رأيتم ان هذه الفتة قد احمرت ، تعطي رائحة كريهة وقد كبر
• حجمها

بعد مرور شهر من الزرع يمكن ان للجراح ان يغلق وهذا يساعد على
• المنظر الخارجي للزرع ويقلل من عمل القلب

الحياة بعد الزرع : 8

العودة للبيت بعد الزرع تعطي الشعور بالفرح ولكنه هذه الفرحة قد ترافقها قلق واكتئاب في بعض الأحيان في اول اسبوع مهم جداً بان تتذكروا بان العودة الحياة الطبيعية يحتاج لعدة اسابيع واشهر ، يجب ان تتعلموا العيش مع الكلى المزروعة ، هذا يحتاج الى وقت . عندما يمر هذا الوقت الحساس للاشهر الاولى ، الاشخاص المزروعين يكونون بفرح ويحاولون استرجاع الحياة الطبيعية . وخصوصاً اذا كان لديهم اولاد فيلعبوا معهم ويرجعوا للحياة الطبيعية

A. التاقلم مع الحياة العائلية

لا يلزم انتباهات خاصة

- اذا احد افراد العائلة شعر برشح ، وجع حلق ، قحة يجب ان يكون بعيد على الاقل مترين عن المريض
- ان لا تقوموا القحة او العطس عند وجود المزروع ، ضعوا حاجز الماسكرة على الفم اذا قربتم منه
- يجب تغيير الماسكرة كل مرة تكون مبلولة والإقامة بتهوية البيئة

B. البيت

- يجب تنظيف البيت خصوصاً الحمام والمطبخ والبراد استعملو سائل عادي للتنظيف . باقي الغرف تنظف عادة ، دائمًا قوموا
- بتغيير هواء البيت

ايضا شراشف السرير ، يجب ان تغير اذا وجد الة لتبريد الهواء يجب ان تنظف دائمًا فلتر

• لا يجب ان تكون رطوبة او اوساخ على الجدران في البيت
• لا تبقوافي مكان رطب ضعوا المسكرة الكمام للحماية
يجب غسل الفراش والباس في غسالة لمناشف والشرافش والباس الداخلي
في درجة حراره مرتفعة للماء °60 لا يلزم فصل لباس افراد العائلة

C. خارج البيت

في البدائيه يجب تجنب اماكن مزدحمة او في الاسواق مثل السوبر ماركت
مكاتب سيارات نقل مقاهي سينما او مسرح . في هذه الحالة ينصح بوضع
كمامة وايضا في المستشفى
• دائمًا البسي الكمامه عندما تاتي الى المستشفى للمراجعة *

امتنع عن القرب (واحفظ مسافة متراً واحداً) من الاشخاص عندهم انفلونزاً * . امتنع اذا امكن ان تبقى بعيداً عن مكان للبناء اين يحفرون

D. نظافة شخصية

من المهم الاعتناء الدقيق بالنظافة الشخصية ، خصوصاً الابدأ والنظافة الشخصية والفم والاسنان

E. الحمية الغذائية

صوره 6

• ضروري اتباع حمية غذائية صحية متوازنة مع الاسف احد عوارض دواء الكورتيزول تزيد شهيّة الأكل وارتفاع الوزن

• لهذا تكون مشكلة للاشخاص المزروعين

• يجب ان تتبع حمية فقيرة من الدسمة والسكر

الوجبات الغذائية تحتوي على فاكهة (بعض منها الموز تحتوي على البوتاسيوم لا يجب ان تأكله بكثرة) ، خضرة ، حبوب ، خبز ، حليب خالي من الدسمة ، اجبان غنية من الكلس ، اللحمة بدون دهن ، سمك ، دجاج واكل ويحتوي بروتين

نصائح اخرى

• يجب ان تزين نفسك كل يوم *

لا تأكل كعك وبسكوت واشياء مالحة بين الوجبات اذا كنت تشعر *

• بالجوع من الافضل تناول الخضرة والفوواكة

تجرب ان تشرب 2 لیتر من الماء او سوائل ماء معدنية بدون صوديوم ، *

• اشرب شاي الاعشاب

بعض الطعام قد يسبب التهاب للمريض يجب المحافظة على طرقة الطبخ *

• واخذ هذه الاطعمة

• قبل الطبخ اغسل اليدي *

قشووا الفاكهة والخضرة وغسلها جيداً ، ايضاً تغسل كل الخضرة *

• والفاكهة اذا كانت مغسولة من السوق وحتى اذا كانت

(بيولوجي) طبيعية

• لا تأكلوا اجبان غير مبسترة مثل اللبن والحلب *

(والاجبان مع خضرة (العفن

- لا تأكلوا بيض نيء او غير مستوى جيدا وكل الطعام الذي فيه زيوت*
- . واشياء اخرى مثل مركبات الصلصة مثل الميونيز وكيتشب
- لا تأكلوا لحمة نية او غير مطبوخة جيدا مثل لحم البقر والدجاج*
- وباقى اللحوم
- لا تأكلوا بعض انواع الاسماك مثل الكلماري والكريدس غير مطبوخة*
- . وكل جميع الاصداف خصوصا الغير مطبوخة
- *. لا تأكلوا نبات البراعم نية*
- . لا تشربوا ماء من الينابيع غير مراقبة*
- لا تأكلوا مكابيس ومربيات مصنوعة في البيت مثل (الفاكهة*
- . والخضرة
- . لا تأكلوا طعام غير سليم (طازة) او بعد تاريخ التخزين
- . استعملوا صحون وادوات مطبخ نظيفة ونظفوا المطبخ دائمًا*
- . خشبة اللحمة يجب ان تغسل بصابون وماء حار بعد الاستعمال*
- يجب ان يكون الطعام مطبوخ جيدا وعلى درجة عالية على النار وفرن*
- . الميكرو

لا تشربوا شاي الاعشاب من محلات العلاج الطبيعي بدون استشارة الطبيب*

الملح

. يجب ان تستعملوا الملح بكمية قليلة جدا

- . استعملوا قليل من الملح للطبخ*
- . جربوا ان لا تضيفوا ملح على الطعام المطبوخ*
- . لا تأكلوا طعام مالح ومكابيس مثل شيبس*
- . امتنعوا من اكل المعلبات*

البوتاسيوم

للبوتاسيوم في بعض الحالات الكلى قد تواجه صعوبة تنظيم مقدار

. البوتاسيوم

- . ينصح بعدم التدخين وشرب الكحول
- مهم : لا تتناولوا عصير الكريب فروت فقد يزيد تركز الادوية في
- . الدم ، وتسبب اعراض سلبية

F. ممارسة الرياضة

- يلزم ممارسة الرياضة بشكل منتظم ، الرجوع للرياضة بعد الزرع
- . خصوصا للذين يمارسونها من قبل يكون اسهل
- تذكروا بان تبدأو الرياضة بشكل خفيف ، بدون جهد حتى تقووا عضلاتكم
- ... احسن رياضه هي المش السريع ، الدرجة الخ
- . لا تنصح ممارسة البوكس ركبي والتسلق على الجبال لانها تضر الكلاوي

G. العمل

- يجب بعد الزرع عمل رياضة خصوصية لتحسين وضع الجسم مضت 3 اشهر من
- . الزرع يجب الرجوع للعمل
- بعض الاعمال مع (الجمهور مع المرضى ، اطباء حيوانات مربى حيوانات
- الخ ..) من الافضل ان تناقش هذا الوضع مع طبيب القسم ، لا تعمل خلال
- (الفترة بعد الزرع (خصوصا الاشهر في العلاج ضد الطرد

H. سياقة السيارة

- . ممنوع سياقة السيارة خلال 4 اسابيع بعد الزرع

I. العلاقة الجنسية

- . المجامعة الجنسية عادة بعد مرور بعض الاشهر تقدر ان تعود
- ، عندما تشعر بصحة جيدة ، اغلب الرجال يعودون الى قوتهم الجنسية

- . مع هذا بعض منهم مع مشاكل صعبة يبقوا عاجز جنسيا
- . اطلبوا مساعدة من الطبيب اذا كان عندكم مشاكل

بعض الادوية للمناعة يمكن ان تاثر على دواء منع الحمل ، لا ينصح بتناول حبوب منع الحمل لانه يزيد خطر العدوى من الافضل استعمال عازل ذكري واقى واذا استعمل مع دهون او رغوة قاتلة للعطايا المهبلي النسائي هي طريقة تانية يجب استشارة طبيب نساء

. الخصب

. كثير من الرجال اصروا ابا بعد عملية الزرع اغلب النساء تعود لهن العادة الشهرية بعد مرور بعض الاشهر للزرع وكثير من النساء خلفوا اطفال بصحة جيدة . ويجب على النساء مشاوره الطبيب على رغبتهن بتكونهن عائلة . لكن يجب عليهن ان ينتظروا سنة قبل البقاء بالحمل ، حتى يقدرن على العلاج خلال الحبل ، مع اخذ كمية بسيطة من دواء المناعة اذا كانت المريضة حامل او تقوم بالترضيع ، علاج المناعة يجب ان يدرس من ناحية الطبيب (الخطر على الام والجنين . يجب ان تستشيروا الطبيب حالا اذا كان عندكم شك بالحمل

I. الفرصة

. من الافضل ان لا تبتعدوا عن مركز الزرع لايام كثيرة في البداية اخبروا الطبيب ، وخذو معكم كفاية من الحبوب واحفظوها في حقيبة اليد ، للخوف بان الحقيقة تمكنا ان تضيع او لاي سبب اخر اذا السفر الطويل ويوجد اختلاف التوقيت يجب انتاخذ الادوية حسب توقيت البلد اين توجدون دون اعتبار توقيت البلد الاتيين منها . يجب اخذ دائمًا ماء معدنية في زجاجة او قنينة مغلقة لا تستعملوا الثلج او كثرة الماء عند غسل الجسم (مثل الدوش ، غسل الاسنان الخ)

. كانوا مطعمين حسب البلاد التي تقومون بزيارتها . كانوا على اتصال مع الدائرة الصحية ضد الفيروس والزرع

صوره 9

M. التطعيم

خلال المراجعة قبل الزرع طبيب العدوى في مركز الزرع يقوم بارشادك على اي تطعيم ملائم للوقاية به بعد عملية الزرع

كل سنة المزروع وافراد عائلته يجب ان يطعموا ضد الانفلونزا او اي . تطعيم يقرره الطبيب

N. حيوانات بيئية

الحيوانات مثل الكلاب والقطط يستطيعون ان يكونوا في نفس بيت المزروع ولكن يجب ان يكونوا تحت مراقبة طبيب الحيوانات يجب اخبار مركز الزرع لان كثير من الحيوانات مثل الببغاء والعصافير والسلحفاء والارنب والسنجباب الخ في بداية الزرع المريض لا يقدر ان يعتني بالقفص فقط بعد مرور بعض الاشهر يجب ان يلبس كفوف تستعمل لمرة واحدة وغسل الابيدي . يجب تجنب الحيوانات اذا كان عندهم اسهال . يجب اخبار الطبيب في حال حدوث قرصة ، عضة او خرمصة من الحيوان يجب الابتعاد عن اخراج الحيوانات لمثل الحصان والبعد عن الزبل يجب لبس الكمامه . عند تنظيف ماء السمك يجب لبس كفوف . ابتعدو عن الحية ، البطة ، زغاليل وحيوانات غريبة

صوره 9

O. زراعة الحدائق والاعتناء

دائما يجب ان تلبس كفوف عندما تعتنى ب الحدائق مع غسل الابيدي . دائما . لا تعطي تغذية او زبل او اخراج الخيل

P. هوايات ونوعية الحياة

لا تدخن و ابتعد عن تدخين الاخرين ، لانه يزيد خطر العدوى ميكروبات . الفيروس . لا تقوم بعمل التاتو . امتنع عن دخول مغارات فيها بقاية اخراج عصافير او حيوانات اخرى

لا تسبحوا او تدخلوا بمياه غير نظيفة او قليلة وفيها بقايا اوساخ . العصافير

مسموح البحر في البحر وفي برك السباحة بدون بلع الماء ، اذا جرحتم في السباحة اغسلوا بماء نظيفة حالا ، لا تذهبوا لينابيع معدنية ، واد ومساج

٥. نوعية الحياة

يجب ان تقبلو التغير في حياتكم ، مثل اخذ الادوية كل يوم او ذهابكم للمستشفى للمراجعة كل فترة . اكثرا الاشخاص يجد حياته جيدة واحسن من قبل

9

٦. الاتصال والعلاقات مع الاطباء

. هذه هي اكبر مسؤولية

مهم جدا الاتصال وال العلاقة مع الاطباء الكلاوي ، جراحين ، طبيب الامراض . المعدية ، طبيب العائلة ، طبيب الاسنان والميدلبي

كل هذه الاشخاص يجب ان يعرفوا بان عندك كلوية مزروعة وبائك تأخذ . ادوية

يجب ان يكون لديك معلومات عن حالتك الصحية الحالية مثل ضغط الدم ، النبض ، كمية البول ، الوزن الشخصي ، كل تغيير من الدواء . او الكمية

. التهاب او عدوة وطريقة علاجهم ، احساس جديد من دواء تذكر بان تجلب معك كل الادوية عندما تذهب الى العطلة او الى اي . مكان بعيد عن البيت لمدة قصيرة او طويلة

٧. الاتصالات

: الجراح العام وعنوانه

0039 0332 393506

0039 0332 278879

: عيادة طبيب الكلاوي

0039 0332 278449

: قسم الكلاوي

0039 0332 278316

: قسم الامراض المعدية والزرع

0039 0332 393378

: امراض معدية - نقطة فحص الدم

0039 0332 393085

: قسم الامراض المعدية

0039 0332 278446

. لتصبح مريض مزروع له قد يعطي تغيير في الحياة

. الطب الحديث اعطى للمريض الزرع امكانية حياة طويلة ونشطة

. خذ بالك على كليتك ، انه عطاء ثمين

. مرفق رقم 1

نظام احتياطي

. المعدية Endocardite

. نشر 116:1736-1754:2007.

عملية في الفم والحلق

لكل ساعة للعملية يوخذ

عن طريق الفم لعملية معقدة خذ ايضا قبل ساعة اعمل حقن في العضل

AMOXICILLINA 2G

. (80 mg) GENTAMICINA

للمرضى الذين عندهم حساسية على البنسلين (فقط للفم وجهاز التنفس) اضف 30 دقيقة للمعالجة

Clindamicina (600 mg) o claritromicina (0, 5)

. عن طريق البلع او بالشرب ، قبل نصف ساعة من العلاج

نظام وخذ احتياط للمرضى الذين عندهم خطر عند معالحة جهاز الهضم والامعاء والمسالك البولية والتناسلية

دقيقة للمعالجة 30

AMPICILLINA (2g). حقنة في العضل او في الوريد

GENTAMICINA (1,5g/KG) في العضل او في الوريد

AMOXICILLINA (1,5 g) بالشرب او بلع

، ساعات بعد العلاج 6

Amoxcilina (1,5 g) . بطريقة الشرب

مرضى عندهم حساسية للبنسلين 1 ساعة قبل العلاج ،) في الوريد او Vancomicina (1g)

Gentamicina في الوريد في العضل

. (1,5mg /kg

2. مرفق رقم

ا. احذر من حالات معينة

الفحوصات ضد العدوى قبل الزرع يعطى امكانية لتقدير حالة المريض

. اذا كان عنده اي عدوى

اذا كان الفحص سلبي ل حالة مصل الدم في السيتوبلازم يجب ان تحاول

ان تتجنب من اخذ عدوى بعد الزرع مهم جدا ان المريض معافى من

Toxoplasma . بان يكون حريص في البيت على النظافة وعلى الاكل

: بعض التحذيرات (التنبيهات) مبينة قبل الزرع

نظام الحفاظ والانتباه للطعام ليمتنع من العدوى من

Toxoplasma qondii

. لا تأكلوا لحمة او سلامة نية او غير مطبوخة جيدا*

. اللحمة تحتاج الى (60 درجة مئوية) للطبخ

قشروا و اغسلوا جيدا الخضرة والفاكهة قبل اكلها ، خصوصا الخضراء*

يمكن ان تكون ملوثة بالخروجالقطط (مثل السلطة والفراءولة الخ

. . .)

اغسلوا ادوات الطبخ والمصحون بعنایة جيدة بالصابون وخصوصا خشبة*

. قطع اللحمة النية

. لا تشربوا حليب غير مبستر خصوصا حليب الغنم*

، لا تشربوا من اليابس غير مراقبة للشرب*

. (خصوصا من البلاد غير المتقدمة)

- امتنعوا من غسل طاحنة القط دائمًا استعملوا كفوف التي تستخدم لمرة* . واحدة ، لهذا اغسلوا ايديكم ، غيروا رمل القطط كل يوم استعملوا كفوف بالحديقة وعند عنایتكم بالارض يمكن ان يكون ملوث* . اغسلوا ايديكم بعد قلع الكفوف . ابقوا القطط بالبيت ولا تقتربوا من الحيوانات* . غذوا القط بطعام من السوق جاهز ومطبوخ جيدا* . لاي شك او سؤال اتصلوا بمركز قسم العدوى للزرع