



Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Medicina Nucleare

Responsabile FF: Dott. Diego De Palma

I pazienti, dopo la somministrazione del radio farmaco, devono evitare i contatti ravvicinati e prolungati con bambini di età < 10 anni secondo la seguente tabella:

- Per 36 ore dopo la somministrazione di **131-I** se l'attività somministrata è maggiore di 10 MBq.
- Per 18 ore dopo la somministrazione di **123 – I** o **111 - In Octreotide**.
- Per 9 ore dopo la somministrazione di **99mTc MDP/ MIBI / Tetrofosmina / HMPAO / ECD / Leukoscan / Tektrotyd / colloidi**
- Per 3 ore dopo la somministrazione di **99mTc MAG3 / DMSA / DTPA/ MAA / pertecnetato**.

Non sono necessarie particolari precauzioni dopo la effettuazione di

- ROLL
- ricerca di linfonodo sentinella
- curva di captazione del radioiodio

per l'esiguità della attività utilizzata.

Il radio farmaco che sarà utilizzato è scritto nel foglio informativo consegnatovi al momento della prenotazione.

Se avete dubbi chiedete al Medico Nucleare al momento della somministrazione