

LOCALIZZAZIONE SCINTIGRAFICA DI LESIONI NON PALPABILI

Principio	questa metodica, conosciuta come ROLL (radioisotope occult lesion localization), serve per localizzare in sala operatoria da parte del chirurgo una lesione non palpabile della mammella o un linfonodo per lo più ascellare, ma anche inguinale, patologico all'ecografia, ma non palpabile, ai fini di consentire al Chirurgo in sala operatoria la localizzazione della lesione mediante sonda per la rilevazione intra-operatoria della radioattività e la conseguente sua asportazione
Indicazioni	lesioni non palpabili della mammella evidenziate alla mammografia o all'ecografia N.B. per Pazienti ricoverati
Prenotazione	presso U.O. Medicina Nucleare tel. 0332 278319 fax 0332 278668
Criteri di accesso	richiesta dello Specialista Chirurgo portare la documentazione relativa alla patologia
Preparazione del paziente	nessuna preparazione
Contro-indicazioni	nessuna
Effetti collaterali	non segnalati
Tracciante	^{99m} Tc macroaggregati di albumina
Attività somministrata	10 MBq
Modalità di somministrazione	Intralesionale sotto guida stereotassica mammografica o ecografica preparata dallo Specialista Radiologo nel reparto di Mammografia o di Radiologia
Tempi di esame	• 15': visita breve e raccolta del consenso informato • 20': somministrazione del tracciante ed acquisizione delle immagini scintigrafiche
Consegna del referto	• consegna immediata del referto in cartella clinica al Chirurgo che dovrà eseguire l'asportazione chirurgica della lesione