

92.18.3 - RICERCA DI METASTASI DI TUMORI TIROIDEI	
Principio	studio della distribuzione di tessuto tiroideo funzionante a livello sia cervicale sia extra cervicale mediante la somministrazione di radioiodio in condizioni di elevati livelli ematici di TSH.
Indicazioni	ricerca di metastasi iodofissanti da carcinoma tiroideo dopo tiroidectomia totale e ablazione con radioiodioterapia del residuo chirurgico
Prenotazione	presso U.O. Medicina Nucleare tel. 0332 278319 fax 0332 278668
Criteri di accesso	portare con sé documentazione radiologica ed ecografica recente
Preparazione del paziente	<ul style="list-style-type: none"> • sospendere la terapia sostitutiva con L-tiroxina 4 settimane prima dell'esame oppure, in alternativa, somministrazione i.m. di rhTSH • evitare, nel frattempo, l'assunzione di preparati ricchi di iodio • effettuare un'accurata pulizia intestinale la sera prima della scansione scintigrafica • bere abbondantemente • è necessario il digiuno <p>(Viene consegnato uno stampato con le istruzioni al momento dell'appuntamento)</p>
Contro-indicazioni	<ul style="list-style-type: none"> • gravidanza accertata o presunta • allattamento (occorre interruzione definitiva)
Effetti collaterali	non segnalati
Tracciante	¹³¹ I ioduro di sodio
Attività somministrata	185 MBq
Modalità di somministrazione	via orale
Tempi di esame	<p>⇒ ESAME in sospensione della L-Tiroxina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15': visita breve, prelievo ematico per dosaggio di fT4, TSH, anticorpi anti-tireoglobulina, tireoglobulina, raccolta del consenso informato e somministrazione del tracciante • 60': scansione alla 72^ ora <p>⇒ ESAME con somministrazione i.m. di rhTSH</p> <ul style="list-style-type: none"> • lunedì 15': visita breve, prelievo ematico per dosaggio di fT4, TSH, anticorpi anti-tireoglobulina, tireoglobulina, raccolta del consenso informato e somministrazione i.m. della prima dose di rhTSH • martedì: 5': somministrazione della seconda dose di rhTSH • mercoledì: 15': prelievo ematico per dosaggio del TSH e somministrazione del radioiodio • venerdì: 60': scansione whole body e prelievo ematico per dosaggio Tg e hTg
Consegna del referto	<ul style="list-style-type: none"> • dopo 3 gg lavorativi dal termine dell'esecuzione dell'indagine • ritiro del referto presso il CUP con pagamento dell'eventuale ticket, se dovuto