

92.18.5 - SCINTIGRAFIA CON TRACCIANTE RECETTORIALE tomoscintigrafia cerebrale con DaTscan®	
Principio	utilizzo di una molecola con elevata affinità per il trasportatore di membrana della dopamina (DaT), per la visualizzazione dell'integrità delle terminazioni pre-sinaptiche del sistema dopaminergico a livello dei nuclei della base nell'encefalo
Indicazioni	<ul style="list-style-type: none"> • diagnosi differenziale tra tremore essenziale e morbo di Parkinson , anche in stadio preclinico. • valutare la gravità e progressione della malattia.
Prenotazione	presso U.O. Medicina Nucleare tel. 0332 278319 fax 0332 278668
Criteri di accesso	necessario portare documentazione relativa a indagini già eseguite per la patologia in studio
Contro-indicazioni	<ul style="list-style-type: none"> • gravidanza accertata o presunta • allattamento (occorre interruzione definitiva)
Effetti collaterali	non segnalati
Preparazione del paziente	<ul style="list-style-type: none"> • sospensione di farmaci interferenti: anfetamine, inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI) • blocco della tiroide mediante somministrazione orale di circa 400 mg di potassio ioduro 30' prima dell'iniezione di DaTscan®
Tracciante	¹²³ I – ioflupane (DaTscan®)
Attività somministrata	130 MBq
Modalità di somministrazione	via endovenosa
Tempi di esame	<ul style="list-style-type: none"> • 15': visita breve, raccolta del consenso informato, somministrazione per os di 2 cp Pertiroid • somministrazione del radiofarmaco dopo 30' <ul style="list-style-type: none"> ◇ intervallo libero: 3-5 ore • 45': acquisizione
Consegna del referto	<ul style="list-style-type: none"> • dopo 3 gg lavorativi dal termine dell'esecuzione dell'indagine • ritiro del referto presso il CUP con pagamento dell'eventuale ticket, se dovuto