

92.05.6 - SCINTIGRAFIA DEL MIDOLLO OSSEO TOTAL BODY

Principio	il tracciante radioattivo si fissa nelle cellule del sistema reticolo-endoteliale del midollo osseo permettendo la valutazione della distribuzione, dello stato di funzionalità e dell'integrità della componente emopoietica del midollo osseo che serve alla produzione delle cellule del sangue circolante, in alcune malattie del sangue o per meglio studiare certe alterazioni ossee
Indicazioni	• malattie mieloproliferative • scelta di sedi per biopsia e/o agoaspirato • valutazione delle modifiche dell'estensione del midollo osseo nelle protesi articolari e, nei casi di sospette infezioni, per la diagnosi differenziale tra modifica estensione midollo e infezione, successivamente a scintigrafia con leucociti marcati
Prenotazione	presso U.O. Medicina Nucleare tel. 0332 278319 fax 0332 278668
Criteri di accesso	necessario portare documentazione relativa a indagini già eseguite per la patologia in studio
Preparazione del paziente	non necessaria
Contro-indicazioni	gravidanza accertata o presunta
Effetti collaterali	non segnalati
Tracciante	^{99m} Tc-nanocolloidi
Attività somministrata	555 MBq/60Kg
Modalità di somministrazione	via endovenosa
Tempi di esame	• 15': visita breve, raccolta consenso informato e iniezione del tracciante • intervallo libero 20' • 30': acquisizione delle immagini scintigrafiche
Consegna del referto	• dopo 3 gg lavorativi dal termine dell'esecuzione dell'indagine • ritiro del referto presso il CUP con pagamento dell'eventuale ticket, se dovuto