

92.15.4 SCINTIGRAFIA POLMONARE CON INDICATORI POSITIVI (⁶⁷GALLIO CITRATO)	
Principio	il Gallio citrato viene captato attivamente sia nei foci infiammatori che di proliferazione cellulare neoplastica e, pertanto, è utilizzato in alcune di queste patologie per visualizzarne l'estensione ed il grado di attività.
Indicazioni	diagnosi e valutazione dell'attività di malattia nella fibrosi polmonare primitiva idiopatica
Prenotazione	presso U.O. Medicina Nucleare tel. 0332 278319 fax 0332 278668
Preparazione del paziente	• la terapia steroidea deve essere sospesa da almeno un mese; • assumere lassativi nei giorni successivi la somministrazione del tracciante e precedenti la scintigrafia, per accelerare l'escrezione intestinale del tracciante
Criteri di accesso	necessario portare documentazione relativa a indagini già eseguite per la patologia in studio
Contro-indicazioni	• gravidanza accertata o presunta • allattamento (è necessaria interruzione definitiva)
Effetti collaterali	non segnalati
Tracciante	⁶⁷Gallio citrato
Attività somministrata	74-80 MBq/60Kg
Modalità di somministrazione	via endovenosa
Tempi di esame	• 15': visita breve, raccolta del consenso informato e somministrazione del radiofarmaco ◊ intervallo libero: 3 giorni • 40': acquisizione delle immagini scintigrafiche
Consegna del referto	• dopo 3 gg lavorativi dal termine dell'esecuzione dell'indagine • ritiro del referto presso il CUP con pagamento dell'eventuale ticket, se dovuto