

92.05.5 - SCINTIGRAFIA SPLENICA

Principio	il tracciante radioattivo si fissa nelle cellule del sistema reticolo-endoteliale permettendo la valutazione morfo-strutturale della milza
Indicazioni	• milza accessoria: nel sospetto clinico di presenza di milza accessoria • trapianto splenico: per valutazione attecchimento di trapianto autologo • traumi: nel caso di sospetta rottura di milza.
Prenotazione	presso U.O. Medicina Nucleare tel. 0332 278319 fax 0332 278668
Criteri di accesso	necessario portare documentazione relativa a indagini già eseguite per la patologia in studio
Preparazione del paziente	non necessaria
Contro-indicazioni	gravidanza accertata o presunta
Effetti collaterali	non segnalati
Tracciante	^{99m} Tc-colloide
Attività somministrata	150 MBq/60Kg
Modalità di somministrazione	via endovenosa
Tempi di esame	• 15': visita breve, raccolta consenso informato e iniezione del tracciante • intervallo libero 20' • 30': acquisizione delle immagini scintigrafiche
Consegna del referto	• dopo 3 gg lavorativi dal termine dell'esecuzione dell'indagine • ritiro del referto presso il CUP con pagamento dell'eventuale ticket, se dovuto