

<b>92.01.2 - SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON CAPTAZIONE, CON O SENZA PROVE FARMACOLOGICHE</b>	
Principio	studio della distribuzione di tessuto tiroideo funzionante a livello cervicale mediante la somministrazione di radioiodio
Indicazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• valutazione del parenchima tiroideo residuo dopo tiroidectomia totale (<b>scintigrafia cervicale</b>)</li> <li>• valutazione del parenchima tiroideo pre-trattamento con radioiodio per terapia radiometabolica dell'ipertiroidismo e del gozzo nodulare compressivo o plongeant (<b>scintigrafia tiroidea</b>)</li> </ul>
Prenotazione	presso U.O. Medicina Nucleare tel. <b>0332 278319</b> fax <b>0332 278668</b>
Criteri di accesso	necessario portare documentazione relativa a indagini già eseguite per la patologia in studio
Preparazione del paziente	<p><b>scintigrafia cervicale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il paziente deve essere in ipotiroidismo (= livelli ematici di TSH &gt;30 microIU/ml)</li> <li>• è necessario il digiuno, che deve essere mantenuto anche per le 2 h successive dopo l'assunzione del tracciante; è però possibile assumere eventuali farmaci con un bicchiere d'acqua</li> </ul> <p><b>scintigrafia tiroidea</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sospensione della terapia tireostatica (es. Tapazole) 5 giorni prima</li> <li>• è necessario il digiuno, che deve essere mantenuto anche per le 2 h successive dopo l'assunzione del tracciante; è però possibile assumere eventuali farmaci con un bicchiere d'acqua</li> </ul>
Contro-indicazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gravidanza accertata o presunta</li> <li>• allattamento (occorre interruzione definitiva)</li> </ul>
Effetti collaterali	non segnalati
Tracciante	<sup>131</sup> I <b>ioduro di sodio</b>
Attività somministrata	→ <b>scintigrafia cervicale: 3.7 MBq</b> → <b>scintigrafia tiroidea: 0.37 MBq</b>
Modalità di somministrazione	<b>per os</b>
Tempi di esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>15'</b>: visita breve, raccolta del consenso informato e somministrazione del tracciante</li> <li>→ <b>scintigrafia cervicale</b></li> <li>• <b>dopo 24h</b>: acquisizione immagine scintigrafica e misura della iodocaptazione a livello della regione cervicale</li> <li>→ <b>scintigrafia tiroidea</b></li> <li>◇ <b>dopo 6h</b>: 1^ misura di captazione</li> <li>◇ <b>dopo 24h</b>: 2^ misura di captazione e acquisizione immagine scintigrafica</li> <li>◇ <b>dopo 96h</b>: 3^ misura di captazione (se necessario)</li> </ul>
Consegna del referto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dopo 3 gg lavorativi dal termine dell'esecuzione dell'indagine</li> <li>• ritiro del referto presso il CUP con pagamento dell'eventuale ticket, se dovuto</li> </ul>