

### 92.01.4 - SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON INDICATORI POSITIVI

Principio	valutazione del rischio di malignità di noduli tiroidei mediante radiofarmaco ad elevata ritenzione intracellulare
Indicazioni	valutazione morfofunzionale delle lesioni nodulari "fredde", con FNA ripetutamente non discriminante
Prenotazione	presso U.O. Medicina Nucleare tel. <b>0332 278319</b> fax <b>0332 278668</b>
Criteri di accesso	necessario portare documentazione relativa a indagini già eseguite per la patologia in studio
Preparazione del paziente	non necessaria
Contro-indicazioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• gravidanza accertata o presunta</li><li>• allattamento (occorre interruzione precauzionale nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante radioattivo)</li></ul>
Effetti collaterali	non segnalati
Tracciante	<sup>99m</sup> Tc-sestaMIBI
Attività somministrata	<b>370 MBq</b>
Modalità di somministrazione	<b>via endovenosa</b>
Tempi di esame	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>15'</b>: visita breve, raccolta del consenso informato e iniezione del tracciante</li><li>• <b>15'</b>: intervallo tra iniezione del tracciante ed acquisizione</li><li>• <b>10'</b>: 1^ acquisizione delle immagini scintigrafiche</li><li>• <b>2 h</b>: intervallo prima della 2^ acquisizione</li><li>• <b>10'</b>: 2^ acquisizione delle immagini scintigrafiche</li></ul>
Consegna del referto	<ul style="list-style-type: none"><li>• dopo 3 gg lavorativi dal termine dell'esecuzione dell'indagine</li><li>• ritiro del referto presso il CUP con pagamento dell'eventuale ticket, se dovuto</li></ul>