92.14.2 - SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE SEGMENTARIA POLIFASICA

Principio	studio della vascolarizzazione e dell'attività metabolica scheletrica attraverso la somministrazione di un radiofarmaco che, fissato ai cristalli di idrossiapatite, riflette l'attività osteoblastica dell'osso e la sua vascolarizzazione
Indicazioni	<ul style="list-style-type: none"> • diagnosi di infezione ossea (osteomielite) o articolare • diagnosi di algoneurodistrofia
Prenotazione	presso U.O. Medicina Nucleare tel. 0332 278319 fax 0332 278668
Criteri di accesso	necessario portare documentazione relativa a indagini già eseguite per la patologia in studio
Preparazione del paziente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ non è necessaria alcuna preparazione particolare • è utile bere abbondantemente nell'intervallo tra l'iniezione e l'acquisizione. • appena prima dell'inizio dell'acquisizione il paziente deve vuotare la vescica
Contro-indicazioni	gravidanza accertata o presunta
Effetti collaterali	non segnalati
Tracciante	^{99m} Tc-HDP (difosfonato)
Attività somministrata	<ul style="list-style-type: none"> • adulti: 560 MBq/60Kg • età pediatrica: ridotta in base all'età e al peso
Modalità di somministrazione	via endovenosa
Tempi di esame	<ul style="list-style-type: none"> • 15': visita breve, raccolta del consenso informato, somministrazione del tracciante • 15': studio dinamico e acquisizione delle immagini scintigrafiche in fase precoce • intervallo libero 3-4h • 30': acquisizione delle immagini scintigrafiche in fase tardiva
Consegna del referto	<ul style="list-style-type: none"> • dopo 3 gg lavorativi dal termine dell'esecuzione dell'indagine • ritiro del referto presso il CUP con pagamento dell'eventuale ticket, se dovuto