

**92.03.4 - STUDIO DEL REFLUSSO VESCICO-URETERALE
(cistoscintigrafia minzionale diretta)**

Principio	il riempimento della vescica per via retrograda può evidenziare la risalita del tracciante radioattivo negli ureteri (reflusso) durante il riempimento e/o durante la minzione.
Indicazioni	reflusso vescico-ureterale: diagnosi e follow-up dopo correzione chirurgica.
Prenotazione	presso U.O. Medicina Nucleare tel. 0332 278319 fax 0332 278668
Criteri di accesso	necessario portare documentazione relativa a indagini già eseguite per la patologia in studio
Preparazione del paziente	il paziente deve effettuare profilassi antibiotica il giorno dell'esame e quello successivo
Contro-indicazioni	gravidanza accertata o presunta
Effetti collaterali	non segnalati
Tracciante	^{99m} Tc pertecnetato
Attività somministrata	20 MBq
Modalità di somministrazione	posizionamento di un catetere vescicale che permette di riempire la vescica con il tracciante e con soluzione fisiologica, in quantità coerente con il Volume Vescicale Teorico (=500ml x Superf.corporea/1.73)
Tempi di esame	<ul style="list-style-type: none"> • 15': visita breve e raccolta del consenso informato • tempistica variabile: acquisizione dinamica delle immagini scintigrafiche durante il riempimento vescicale e sino a svuotamento della vescica tramite minzione spontanea
Consegna del referto	<ul style="list-style-type: none"> • dopo 3 gg lavorativi dal termine dell'esecuzione dell'indagine • ritiro del referto presso il CUP con pagamento dell'eventuale ticket, se dovuto