92.04.3 - STUDIO DEL REFLUSSO a) GASTRO-ESOFAGEO O b) DUODENO-GASTRICO	
Principio	<p>b) al termine della assunzione di alimento liquido (succo d'arancia per gli adulti e latte per i lattanti) contenente un radiocomposto, si valuta, mediante la acquisizione di immagini seriate nel tempo, il possibile reflusso</p> <p>b) dopo somministrazione di un tracciante delle vie biliari e la sua escrezione in duodeno, si valuta, mediante la acquisizione di immagini seriate nel tempo, il possibile reflusso</p>
Indicazioni	<ul style="list-style-type: none"> • nausea e vomito cronico post-prandiale. • laringite cronica • polmonite ab ingestis: in particolare in età pediatrica. • follow-up dopo correzione chirurgica.
Prenotazione	presso U.O. Medicina Nucleare tel. 0332 278319 fax 0332 278668
Preparazione del paziente	digiuno da circa 6 ore; <i><u>N.B. per a) il paziente deve portare con sé due arance</u></i>
Criteri di accesso	necessario portare documentazione relativa a indagini già eseguite per la patologia in studio
Contro-indicazioni	gravidanza accertata o presunta
Effetti collaterali	non segnalati
Tracciante	<p>a) ^{99m}Tc-colloide;</p> <p>b) ^{99m}Tc-mebrofenina (derivato dell'acido imidoacetico)</p>
Attività somministrata	a) 30 MBq; b) 185 MBq/60 Kg
Modalità di somministrazione	<p>a) per os dopo aver sciolto il tracciante in succo di arancia acidificato o, per i lattanti ed eventualmente anche per i bambini, in latte;</p> <p>b) per via endovenosa</p>
Tempi di esame	<ul style="list-style-type: none"> • 15': visita breve, raccolta consenso informato, somministrazione del tracciante • 30-45': acquisizione delle immagini scintigrafiche sia in condizioni basali sia dopo manovre volte a incrementare la pressione endoaddominale (manovra di Valsalva nell'adulto, compressione manuale addominale nei lattanti e/o nei bambini)
Consegna del referto	<ul style="list-style-type: none"> • dopo 3 gg lavorativi dal termine dell'esecuzione dell'indagine • ritiro del referto presso il CUP con pagamento dell'eventuale ticket, se dovuto