

CASO CLINICO 1

lattante di 1 mese

- Anamnesi familiare negativa per patologia di rilevanza genetica.
- Decorso della gravidanza regolare, riferiti scarsi movimenti fetali
- Eseguita amniocentesi per età materna con cariotipo maschile normale
- Parametri auxologici neonatali nella norma APGAR 8/9
- Presenza sin dai primi giorni di ipotono assiale.
- Difficoltà progressiva alla suzione

- Quale iter diagnostico ?

CASO CLINICO 2

- Erica 4 anni
- Tumefazione asintomatica in sede sovramammaria destra.
- (notata dalla madre mentre la lavava)
- Nello spazio tra mammella e pilastro anteriore dell'ascella destra massa teso-elastica fissa alla cute, solo parzialmente mobile sui piani profondi, non dolente, coperta da cute normale.
- Esame obiettivo: buone condizioni generali, organi ipocondriaci normali, piccoli linfonodi ascellari a destra molli e mobili
- Ecografia cute: massa solida di 3.5 x 3 cm.
- Esami laboratorio:
 - Hb 11.0 g/dl
 - GB 11.500 /mm³ (N 45%)
 - PLT 470.000 mm³
 - LDH 458 UI/L
 - PCR 0.6 mg/dl VES 1[^] ora 20
- Quale iter diagnostico ?

CASO CLINICO 3

Maria Luisa 13 anni

Tosse stizzosa da circa 3 mesi
Febbricola da qualche giorno

Esame obiettivo: linfonodi sovraclaveari aumentati di consistenza e volume, poco mobili sui piani sottostanti e riduzione del murmure alla base di destra con ottusità alla percussione.

Esami di laboratorio:

Hb 10.4 g/dl

GB 10.050 mm³ (N 82%, L 7%)

PLT 441.000 mm³

AST 135 ALT 148 U/l

LDH 1.788 U/l

VES 1[^] ora 59

- Quale iter diagnostico ?