

PROVA SCRITTA n°2

1. Identifica tra le seguenti l'opzione corretta:

1. le maschere FFP3 sono inefficaci contro virus
2. le maschere FFP3 ed FFP2 hanno eguali capacità di filtrazione
- 3. le maschere FFP3 garantiscono una filtrazione maggiore del 95%**
4. tutte le affermazioni sono corrette

2. Uno degli strumenti che permette la valutazione del rischio cadute è la scala di:

1. Braden
- 2. Conley**
3. Barthel
4. Glasgow

3. Per emiparesi si intende:

1. l'incapacità di riconoscere i volti
- 2. Perdita parziale della funzione motoria di una metà del corpo**
3. la visione sdoppiata di un oggetto singolo
4. la difficoltà ad urinare

4. Un uomo di 78 anni presenta ulcera profonda e molto dolorante a livello della caviglia; le estremità sono fredde e cianotiche. Molto probabilmente ci troviamo di fronte a:

1. ulcera gastrica
- 2. ulcera arteriosa**
3. ulcera peptica
4. ulcera aftosa

5. Per “ernia” si intende:

1. un processo purulento localizzato
2. una forma di peritonite
3. **la fuoriuscita di un viscere dalla cavità che normalmente lo contiene**
4. un processo osseo vertebrale

6. Quale fra queste è una scala di valutazione dello stato mentale:

1. Scala di Braden
2. Cincinnati Prehospital Stroke Scale
3. **Mini Mental State Examination**
4. Scala di Conley

7. La “catena della sopravvivenza” consta, in sequenza, delle seguenti fasi:

1. RCP precoce, Valutazione dello stato della cute, soccorso vitale avanzato, diuresi e natremia
2. defibrillazione precoce, trasporto avanzato, allerta precoce del sistema di soccorso di emergenza/urgenza e soccorso vitale
3. trasporto avanzato precoce, RCP precoce, allerta precoce del sistema di soccorso di emergenza/urgenza, defibrillazione precoce
4. **allerta precoce del sistema di soccorso di emergenza/urgenza, RCP precoce di alta qualità, defibrillazione precoce, trasporto e soccorso vitale avanzato**

8. Per anisocoria si intende:

1. **la presenza di pupille con dimensioni tra loro diverse**
2. la visione sdoppiata di un oggetto singolo
3. l’incapacità di esprimersi mediante l’uso della parola
4. la difficoltà ad urinare

9. Per quale delle seguenti patologie è indicato l’utilizzo di un ventilatore CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)?

1. Insufficienza renale
2. Ipertensione arteriosa
3. **OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)**
4. asma bronchiale

10. Cosa si intende per “Sincope”?

1. perdita improvvisa dell'appetito
2. difficoltà respiratoria grave, necessità di ossigeno ad alti flussi
3. difficoltà grave alla deglutizione
- 4. improvvisa e completa perdita di coscienza**

11. Quali sono i valori normali della Frequenza Cardiaca in un adulto sano a riposo?

1. 120-150 battiti/min
2. 3-6 battiti/min
- 3. 60-100 battiti/min**
4. 20-30 battiti/min

12. Quale dei seguenti interventi è importante nella persona con difficoltà di deglutizione?

1. somministrazione di bevande dolci
2. somministrazione di alimenti a doppia consistenza
- 3. igiene del cavo orale**
4. tutte le risposte sono corrette

13. Per l'effettuazione dell'esame di urinocoltura, è necessario prelevare un campione:

1. da primissimo mitto
2. subito prima di dormire
- 3. da mitto intermedio**
4. dopo un pasto abbondante

14. Nell'individuo di sesso maschile adulto sano, il valore dell'emoglobina nel sangue:

1. È di circa 7-10 g/dl
- 2. È di circa 14-18 g/dl**
3. È di circa 42-52 g/dl
4. È di circa 135-145 g/dl

15. Il delirium è:

1. uno stato di insonnia cronico
2. uno stato di depressione post-partum

3. un disturbo acuto e reversibile dell'attenzione, dello stato cognitivo e del livello di coscienza

4. nessuna delle precedenti

16. Quale dei seguenti materiali NON è necessario per l'intubazione endotracheale?

1. Laringoscopio

2. Pinza di Klemmer

3. Tubo tracheale

4. Pinza di Magill

17. Quali tra i seguenti interventi può essere messo in atto per la prevenzione delle cadute accidentali?

1. Utilizzo di scarpe con suola con antiscivolo

2. Posizionare un materasso antidecubito

3. Evitare di idratare il paziente

4. Tutte le affermazioni sono errate

18. Cosa si intende per "Near Miss":

1. evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente non intenzionale e indesiderabile

2. errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente

3. evento avverso di particolare gravità che può comportare morte o grave danno al paziente

4. nessuna delle precedenti

19. Con la L. 251/2000 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica", viene riconosciuta la possibilità di istituire:

1. Dirigenza delle professioni sanitarie

2. Presidenza dei sanitari

3. Nuove linee guida

4. Contratto collettivo Nazionale

20. Il D.M 739/1994 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere" individua come formazione post base i seguenti ambiti:

1. Sanità pubblica, pediatria, salute mentale, geriatria, area critica

2. Sanità pubblica, pediatria
3. Salute mentale, geriatria
4. Area critica

21. Individuare l'affermazione ERRATA riguardante il Sondino Naso-Gastrico (SNG)

1. Può essere posizionato al fine di garantire l'alimentazione a pazienti disfagici
2. Può essere di diverso calibro
- 3. Può essere posizionato solo dallo specialista gastroenterologo**
4. Può essere eseguito un rx del torace per verificare il corretto posizionamento

22. Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019 all'art. 36 sancisce che:
"l'infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale, ,
per la sicurezza dell'assistito, l'attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e
a lui affidati".

Completare lo spazio libero nel testo, indicando l'opzione corretta tra le risposte seguenti.

1. pianifica, coordina, ma non verifica
- 2. pianifica, supervisiona, verifica**
3. programma, non supervisiona, corregge
4. programma, coordina, non supporta

23. Quali sono, secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 17 del Dicembre 2014, i cosiddetti momenti di Transizione di Cura in cui è essenziale effettuare una revisione accurata dei medicinali assunti dal paziente per ridurre il rischio di errori in corso di terapia farmacologica?

1. il ricovero e la dimissione del paziente in ospedale
2. il trasferimento del paziente tra reparti della stessa struttura
3. il trasferimento del paziente in un'altra struttura ospedaliera o extraospedaliera
- 4. tutte le precedenti**

24. Cosa significa la sigla RCT?

1. Randomizzazione Controllata e Testata
2. è l'acronimo inglese che significa gruppo di ricerca clinico (Research Clinical Team)
3. Rischio Clinico Teorico

- 4. è l'acronimo inglese che significa studio clinico randomizzato e controllato (Randomized Controlled Trial)**

25. Nella lettera di dimissione di un paziente allettato è riportata la presenza di una lesione da pressione al 1° stadio: a cosa corrisponde?

- 1. iperemia che non scompare alla digitopressione**
2. lesione cutanea a spessore totale con degenerazione e/o necrosi del sottocutaneo
3. zona iperemica con presenza di vesciche sierose
4. necrosi tissutale profonda, con interessamento muscolare e/od osseo

26. In condizioni fisiologiche, il valore della Natremia (sodiemia):

- 1. È di circa 135-145 mEq/L**
2. È di circa 105-130 mEq/L
3. È di circa 3,5-5,0 mEq/L
4. È di circa 175-200 mEq/L

27. Per caduta, secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 13 aggiornata al 1 Dicembre 2011, si intende:

1. un improvviso spostamento verso l'alto dalla posizione seduta;
- 2. un improvviso, non intenzionale, inaspettato spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica o assisa o clinostatica;**
3. un voluto e intenzionale spostamento verso il basso dalla sola posizione ortostatica;
4. nessuna delle precedenti

28. In condizioni di normalità, il range fisiologico di riferimento per la SpO₂ è:

1. tra l'88% e il 95%
2. sempre inferiore al 5%
3. 16-20 atti/minuto
- 4. maggiore del 95 %**

29. la VAS (Visual Analogue Scale) è una scala di valutazione usata per misurare:

1. la pressione arteriosa
2. la frequenza cardiaca

3. la SpO_2 .

4. **il dolore**

30. L'algoritmo BLS (Basic Life Support), nell'adulto, comprende compressioni toraciche e insufflazioni d'aria in un rapporto:

1. **30:2**

2. 25:5

3. 15:2

4. 20:2

DOMANDA DI RISERVA

31. Al signor Mario Rossi si deve somministrare Gentamicina 40 mg per via intramuscolare. Si ha a disposizione una fiala di Gentamicina da 80 mg/2 ml, quanti ml devono essere prelevati?

1. **1 ml**

2. 0,5 ml

3. 2 ml

4. 4 ml