

PROVA SCRITTA n°1

1. In riferimento al posizionamento delle derivazioni precordiali durante l'esecuzione dell'ECG (Elettro Cardio Gramma), la V4:
 1. va posizionata nel secondo spazio intercostale sinistro sulla linea ascellare anteriore
 2. va posizionata nel secondo spazio intercostale destro sulla linea ascellare media
 - 3. va posizionata nel quinto spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclaveare**
 4. va posizionata nel terzo spazio intercostale destro lungo la linea parasternale
2. Un paziente adulto si definisce oligurico se la quantità di urine escrete nelle 24 ore è inferiore a:
 1. 1000-1100 ml
 2. 1400-1600 ml
 3. 0-100 ml
 - 4. 400-500 ml**
3. L'ascite è:
 1. una condizione di accumulo patologico di liquido all'interno della cavità cerebrale
 2. una condizione di trombosi agli arti inferiori
 - 3. una condizione di accumulo patologico di liquido all'interno della cavità addominale**
 4. una condizione di litiasi renale
4. In condizioni fisiologiche, il valore della Kaliemia (potassiemia):
 - 1. È di circa 3,5-5,0 mEq/L**
 2. È di circa 8,5-10,0 mEq/L
 3. È di circa 0-3,0 mEq/L
 4. È di circa 135,0-145,0 mEq/L

5. Vomito, dolore, distensione addominale, alvo chiuso a feci e gas sono segni e sintomi di:
1. litiasi renale
 2. infarto cardiaco
 - 3. occlusione intestinale**
 4. nessuna delle precedenti
6. Quale tra i seguenti gruppi sono gli elementi da valutare in condizioni di emergenza/urgenza nel BLS (Basic Life Support)?
- 1. stato di coscienza, pervietà delle vie aeree, respiro e circolo**
 2. favella, motilità agli arti, diuresi
 3. stato di coscienza, diuresi nelle 24 ore, drenaggi
 4. sodiemia, kaliemia, calcemia
7. Quale tipologia di isolamento si applica per il Clostridium Difficile?
1. droplets
 2. aereo
 - 3. contatto**
 4. respiratorio
8. Il momento migliore (timing) per effettuare un prelievo per emocoltura è:
1. dopo la somministrazione di antibiotico
 - 2. durante il picco febbrile**
 3. sempre la prima mattinata
 4. dopo un pasto abbondante
9. Quale metodo NON può essere utilizzato per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico:
1. a vapore
 2. ad ossido di etilene
 - 3. a fiamma ossidrica**
 4. a gas plasma di perossido d'idrogeno

10. IL PICC è:

1. un catetere periferico ad inserimento centrale
2. un catetere centrale ad inserimento centrale
- 3. un catetere centrale ad inserimento periferico**
4. una tipologia di catetere vescicale

11. L'Evidence Based Nursing (EBN) è:

1. una teoria secondo la quale l'assistenza infermieristica deve basarsi solo sull'esperienza maturata in reparto
2. un approccio attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristica erogate sono basate sulle indicazioni del collega meno esperto
- 3. un approccio metodologico attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristica erogate sono basate su prove di efficacia**
4. nessuno delle precedenti

12. Per prevenire le lesioni da pressione è necessario:

- 1. mantenere la cute pulita ed asciutta**
2. fare continue applicazioni caldo-umide
3. effettuare massaggi con soluzione a base alcolica
4. effettuare la cura della cute con antisettici specifici

13. la NRS (Numerical Rating Scale) è una scala di valutazione usata per misurare:

- 1. il dolore**
2. la pressione arteriosa
3. la frequenza cardiaca
4. la SpO₂.

14. Il peritoneo è:

1. Una membrana sierosa che avvolge i polmoni
2. Una membrana sierosa che avvolge il cuore
3. Una membrana sierosa che avvolge il mesencefalo
- 4. Una membrana sierosa che avvolge gli organi addomino-pelvici**

15. Le complicanze della Nutrizione Enterale possono essere:

1. metaboliche
2. gastroenteriche
3. meccaniche
4. **tutte le precedenti**

16. Quali sono le manovre che consentono di migliorare la pervietà delle vie aeree ostruite a seguito dell'ostruzione da parte della lingua o di altre strutture delle vie aeree superiori?

1. Iperestensione del capo
2. Sollevamento del mento
3. Sublussazione della mandibola
4. **Tutte le precedenti**

17. Individuare l'affermazione CORRETTA riguardante il Catetere Venoso Centrale (CVC):

1. Non può essere inserito in vena femorale
2. Viene utilizzato esclusivamente per l'esecuzione della terapia dialitica
3. Viene posizionato solo ai pazienti ricoverati in terapia intensiva
4. **Garantisce un accesso stabile e sicuro, attraverso cui è possibile somministrare ampi volumi di soluzioni o farmaci che richiedono un elevato flusso o soluzioni con osmolarità troppo elevata per la somministrazione periferica**

18. Quali tra quelli di seguito elencati costituiscono "eventi sentinella" che possono derivare, tra le possibili cause, da una errata identificazione del paziente:

1. procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata
2. reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità ABO
3. morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica
4. **tutte le precedenti**

19. 1. L'art 4 del codice deontologico delle Professioni Infermieristiche definisce la relazione come:

1. **Tempo di cura**
2. Tempo di somministrazione
3. Tempo perso
4. Tempo aggiuntivo

20. Il codice deontologico è stato redatto da:

1. **Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche - FNOPI**
2. Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST
3. Azienda Tutela della Salute – ATS
4. Collegio sindacale

21. Individuare l'affermazione ERRATA riguardante il Catetere Vescicale (CV)

1. **Può essere posizionato solo dallo specialista urologo**
2. Può essere in lattice o in silicone
3. Può essere posizionato in caso di ritenzione urinaria
4. Può essere estemporaneo, a breve termine o a permanenza

22. La legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie”

1. sostituisce la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” con “professione sanitaria”
2. abroga il regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale (D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225)
3. rende equipollenti i diplomi e attestati conseguiti in base alla precedente normativa ai diplomi universitari
4. **tutte le precedenti**

23. Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019 all'art. 35 sancisce che:

1. **l'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico**
2. l'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico
3. l'infermiere riconosce che la contenzione è fondamentale per l'assistenza
4. nessuna delle precedenti

24. Quale acronimo, secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n.12 dell'Agosto 2010, è utilizzato per indicare quei farmaci che possono essere facilmente scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome e/o per l'aspetto simile delle confezioni?

1. LOSA
2. LESO
3. LISI

4. LASA

25. In riferimento al BLS (Basic Life Support), se effettuando una corretta valutazione accerti che la vittima ha circolo e sta respirando normalmente ma è ancora incosciente, fai adottare la posizione:

1. seduta
2. semi-seduta
- 3. laterale di sicurezza**
4. prona

26. Per somministrare infusioni tramite un catetere totalmente impiantabile o port-a-cath, quale tipologia di ago si può utilizzare?

- 1. ago di Huber**
2. ago da biopsia
3. ago a farfalla
4. ago cannula

27. Per evitare la dislocazione d'anca in un paziente sottoposto a intervento chirurgico di protesizzazione totale, è necessario:

1. istruire il paziente ad assumere l'abduzione delle gambe e non flettere l'anca interessata oltre i 90°
2. posizionare un cuscino tra le gambe durante il sonno e la mobilizzazione nel letto
3. non assumere il decubito laterale omologo alla sede di intervento fino a che non ci sia indicazione del clinico

4. tutte le precedenti

28. Una donna di anni 63, obesa, presenta ulcera malleolare poco profonda ma molto essudante, accompagnata da edema e iperpigmentazione cutanea. Molto probabilmente ci troviamo di fronte:

1. ulcera gastrica
- 2. ulcera venosa**
3. ulcera peptica

4. ulcera aftosa

29. Quali di questi vasi giunge all'atrio destro?

1. aorta

2. vena basilica

3. arteria radiale

4. vena cava superiore

30. Quanti sono i momenti fondamentali per l'igiene delle mani?

1. 10

2. 5

3. 0

4. 1

DOMANDA DI RISERVA

31. Si deve somministrare come profilassi antibiotica al signor Mario Rossi Gentamicina 60 mg per via intramuscolare. Si ha a disposizione una fiala di Gentamicina da 80 mg/2 ml, quanti ml devono essere prelevati?

5. 0,5 ml

6. 2 ml

7. 4 ml

8. 1,5 ml

PROVA SCRITTA n°2

1. Identifica tra le seguenti l'opzione corretta:
 1. le maschere FFP3 sono inefficaci contro virus
 2. le maschere FFP3 ed FFP2 hanno eguali capacità di filtrazione
 - 3. le maschere FFP3 garantiscono una filtrazione maggiore del 95%**
 4. tutte le affermazioni sono corrette

2. Uno degli strumenti che permette la valutazione del rischio cadute è la scala di:
 1. Braden
 - 2. Conley**
 3. Barthel
 4. Glasgow

3. Per emiparesi si intende:
 1. l'incapacità di riconoscere i volti
 - 2. Perdita parziale della funzione motoria di una metà del corpo**
 3. la visione sdoppiata di un oggetto singolo
 4. la difficoltà ad urinare

4. Un uomo di 78 anni presenta ulcera profonda e molto dolorante a livello della caviglia; le estremità sono fredde e cianotiche. Molto probabilmente ci troviamo di fronte a:
 1. ulcera gastrica
 - 2. ulcera arteriosa**
 3. ulcera peptica
 4. ulcera aftosa

5. Per “ernia” si intende:

1. un processo purulento localizzato
2. una forma di peritonite
- 3. la fuoriuscita di un viscere dalla cavità che normalmente lo contiene**
4. un processo osseo vertebrale

6. Quale fra queste è una scala di valutazione dello stato mentale:

1. Scala di Braden
2. Cincinnati Prehospital Stroke Scale
- 3. Mini Mental State Examination**
4. Scala di Conley

7. La “catena della sopravvivenza” consta, in sequenza, delle seguenti fasi:

1. RCP precoce, Valutazione dello stato della cute, soccorso vitale avanzato, diuresi e natremia
2. defibrillazione precoce, trasporto avanzato, allerta precoce del sistema di soccorso di emergenza/urgenza e soccorso vitale
3. trasporto avanzato precoce, RCP precoce, allerta precoce del sistema di soccorso di emergenza/urgenza, defibrillazione precoce
- 4. allerta precoce del sistema di soccorso di emergenza/urgenza, RCP precoce di alta qualità, defibrillazione precoce, trasporto e soccorso vitale avanzato**

8. Per anisocoria si intende:

- 1. la presenza di pupille con dimensioni tra loro diverse**
2. la visione sdoppiata di un oggetto singolo
3. l’incapacità di esprimersi mediante l’uso della parola
4. la difficoltà ad urinare

9. Per quale delle seguenti patologie è indicato l’utilizzo di un ventilatore CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)?

1. Insufficienza renale
2. Ipertensione arteriosa
- 3. OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)**
4. asma bronchiale

10. Cosa si intende per “Sincope”?

1. perdita improvvisa dell'appetito
2. difficoltà respiratoria grave, necessità di ossigeno ad alti flussi
3. difficoltà grave alla deglutizione
- 4. improvvisa e completa perdita di coscienza**

11. Quali sono i valori normali della Frequenza Cardiaca in un adulto sano a riposo?

1. 120-150 battiti/min
2. 3-6 battiti/min
- 3. 60-100 battiti/min**
4. 20-30 battiti/min

12. Quale dei seguenti interventi è importante nella persona con difficoltà di deglutizione?

1. somministrazione di bevande dolci
2. somministrazione di alimenti a doppia consistenza
- 3. igiene del cavo orale**
4. tutte le risposte sono corrette

13. Per l'effettuazione dell'esame di urinocoltura, è necessario prelevare un campione:

1. da primissimo mitto
2. subito prima di dormire
- 3. da mitto intermedio**
4. dopo un pasto abbondante

14. Nell'individuo di sesso maschile adulto sano, il valore dell'emoglobina nel sangue:

1. È di circa 7-10 g/dl
- 2. È di circa 14-18 g/dl**
3. È di circa 42-52 g/dl
4. È di circa 135-145 g/dl

15. Il delirium è:

1. uno stato di insonnia cronico
2. uno stato di depressione post-partum

3. un disturbo acuto e reversibile dell'attenzione, dello stato cognitivo e del livello di coscienza

4. nessuna delle precedenti

16. Quale dei seguenti materiali NON è necessario per l'intubazione endotracheale?

1. Laringoscopio

2. Pinza di Klemmer

3. Tubo tracheale

4. Pinza di Magill

17. Quali tra i seguenti interventi può essere messo in atto per la prevenzione delle cadute accidentali?

1. Utilizzo di scarpe con suola con antiscivolo

2. Posizionare un materasso antidecubito

3. Evitare di idratare il paziente

4. Tutte le affermazioni sono errate

18. Cosa si intende per "Near Miss":

1. evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente non intenzionale e indesiderabile

2. errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente

3. evento avverso di particolare gravità che può comportare morte o grave danno al paziente

4. nessuna delle precedenti

19. Con la L. 251/2000 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica", viene riconosciuta la possibilità di istituire:

1. Dirigenza delle professioni sanitarie

2. Presidenza dei sanitari

3. Nuove linee guida

4. Contratto collettivo Nazionale

20. Il D.M 739/1994 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere" individua come formazione post base i seguenti ambiti:

1. Sanità pubblica, pediatria, salute mentale, geriatria, area critica

2. Sanità pubblica, pediatria
3. Salute mentale, geriatria
4. Area critica

21. Individuare l'affermazione ERRATA riguardante il Sondino Naso-Gastrico (SNG)

1. Può essere posizionato al fine di garantire l'alimentazione a pazienti disfagici
2. Può essere di diverso calibro
- 3. Può essere posizionato solo dallo specialista gastroenterologo**
4. Può essere eseguito un rx del torace per verificare il corretto posizionamento

22. Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019 all'art. 36 sancisce che:
"l'infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale, ,
per la sicurezza dell'assistito, l'attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e
a lui affidati".

Completare lo spazio libero nel testo, indicando l'opzione corretta tra le risposte seguenti.

1. pianifica, coordina, ma non verifica
- 2. pianifica, supervisiona, verifica**
3. programma, non supervisiona, corregge
4. programma, coordina, non supporta

23. Quali sono, secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 17 del Dicembre 2014, i cosiddetti momenti di Transizione di Cura in cui è essenziale effettuare una revisione accurata dei medicinali assunti dal paziente per ridurre il rischio di errori in corso di terapia farmacologica?

1. il ricovero e la dimissione del paziente in ospedale
2. il trasferimento del paziente tra reparti della stessa struttura
3. il trasferimento del paziente in un'altra struttura ospedaliera o extraospedaliera
- 4. tutte le precedenti**

24. Cosa significa la sigla RCT?

1. Randomizzazione Controllata e Testata
2. è l'acronimo inglese che significa gruppo di ricerca clinico (Research Clinical Team)
3. Rischio Clinico Teorico

4. è l'acronimo inglese che significa studio clinico randomizzato e controllato (Randomized Controlled Trial)

25. Nella lettera di dimissione di un paziente allettato è riportata la presenza di una lesione da pressione al 1° stadio: a cosa corrisponde?

- 1. iperemia che non scompare alla digitopressione**
2. lesione cutanea a spessore totale con degenerazione e/o necrosi del sottocutaneo
3. zona iperemica con presenza di vesciche sierose
4. necrosi tissutale profonda, con interessamento muscolare e/od osseo

26. In condizioni fisiologiche, il valore della Natremia (sodiemia):

- 1. È di circa 135-145 mEq/L**
2. È di circa 105-130 mEq/L
3. È di circa 3,5-5,0 mEq/L
4. È di circa 175-200 mEq/L

27. Per caduta, secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 13 aggiornata al 1 Dicembre 2011, si intende:

1. un improvviso spostamento verso l'alto dalla posizione seduta;
- 2. un improvviso, non intenzionale, inaspettato spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica o assisa o clinostatica;**
3. un voluto e intenzionale spostamento verso il basso dalla sola posizione ortostatica;
4. nessuna delle precedenti

28. In condizioni di normalità, il range fisiologico di riferimento per la SpO₂ è:

1. tra l'88% e il 95%
2. sempre inferiore al 5%
3. 16-20 atti/minuto
- 4. maggiore del 95 %**

29. la VAS (Visual Analogue Scale) è una scala di valutazione usata per misurare:

1. la pressione arteriosa
2. la frequenza cardiaca

3. la SpO₂.

4. il dolore

30. L'algoritmo BLS (Basic Life Support), nell'adulto, comprende compressioni toraciche e insufflazioni d'aria in un rapporto:

1. 30:2

2. 25:5

3. 15:2

4. 20:2

DOMANDA DI RISERVA

31. Al signor Mario Rossi si deve somministrare Gentamicina 40 mg per via intramuscolare. Si ha a disposizione una fiala di Gentamicina da 80 mg/2 ml, quanti ml devono essere prelevati?

1. 1 ml

2. 0,5 ml

3. 2 ml

4. 4 ml

PROVA SCRITTA n°3

1. Quale dei seguenti alimenti è indicato in una dieta per pazienti disfagici:
 1. pastina in brodo
 2. arrosto e fagiolini
 3. **semolino**
 4. minestrone con riso

2. Quali sono i valori normali della Frequenza Respiratoria in un adulto sano a riposo?
 1. **12-20 atti/min**
 2. 70-90 atti/min
 3. 3-6 atti/min
 4. 20-30 atti/min

3. La pleura è:
 1. Una membrana sierosa che avvolge intimamente il cuore
 2. Una membrana sierosa che avvolge intimamente gli organi addominali
 3. **Una membrana sierosa che avvolge intimamente i polmoni**
 4. Una membrana sierosa che avvolge intimamente il fegato

4. Nelle Sindromi delle apnee ostruttive del sonno il paziente manifesta una serie di sintomi. Quale, tra quelli sotto riportati, NON è tipico di tale patologia?
 1. astenia
 2. cefalea al risveglio
 3. ipersonnia
 4. **diarrea**

5. Lo shock ipovolemico, può essere causato da:
 1. miocarditi, alterazioni valvolari cardiache, embolie polmonari
 - 2. emorragie massive, disidratazione ed ustioni di grave entità**
 3. batteri della classe MRSA (Staphylococcus Aureus Meticillino-Resistente)
 4. allergeni

6. Quali patologie possono incrementare la Pressione Intracranica (PIC)?
 1. Neoplasie cerebrali
 2. Emorragie cerebrali
 3. Idrocefalo
 - 4. Tutte le precedenti**

7. La melena è:
 1. presenza di sangue rosso vivo nelle feci
 2. copioso sanguinamento rettale
 3. evacuazione di feci purulente
 - 4. nessuna delle precedenti**

8. Il pericardio è:
 1. Una membrana sierosa che avvolge intimamente i polmoni
 2. Una membrana sierosa che avvolge intimamente gli organi addominali
 - 3. Una membrana sierosa che avvolge intimamente il cuore**
 4. Una membrana sierosa che avvolge intimamente il fegato

9. In un paziente con apparecchio gessato a un arto, quali segni e sintomi si devono monitorare all'estremità interessata al fine di prevenire danni alla funzionalità neurovascolare?
 1. colorito cutaneo
 2. temperatura cutanea
 3. presenza di dolore e/o parestesie
 - 4. tutte le precedenti**

10. Individua il comportamento corretto dell'infermiere, se il paziente ha un agito aggressivo:

1. assumere un atteggiamento aggressivo
2. adottare subito la contenzione fisica
- 3. mostrarsi calmi, prendendo le indispensabili misure di sicurezza**
4. fargli capire chi è il più forte

11. In caso di ipoglicemia marcata si avranno, tra gli altri, i seguenti sintomi:

1. sudorazione, emesi, dolore toracico, astenia
- 2. sudorazione, tachicardia, obnubilamento del sensorio, capogiri, astenia**
3. sudorazione, bradicardia, oliguria, cefalea, coma iperosmolare
4. sudorazione, pallore, mialgia, fibrillazione atriale, astenia

12. Per poliuria si intende:

1. un'escrezione urinaria maggiore di 1 litro nell'arco di 24 ore
2. un'escrezione urinaria minore di 1,5 litri nell'arco di 24 ore
3. un'escrezione urinaria minore di 0,5 litri nell'arco di 24 ore
- 4. un'escrezione urinaria maggiore di 2,5-3 litri nell'arco di 24 ore**

13. Per afasia si intende:

- 1. l'Incapacità di esprimersi mediante la parola o di comprendere il significato delle parole dette da altri**
2. l'incapacità di riconoscere i volti
3. la visione sdoppiata di un oggetto singolo
4. la difficoltà ad urinare

14. La sterilizzazione è

1. un processo atto alla distruzione dei soli microrganismi patogeni
2. un processo atto all'abbassamento della carica microbica da oggetti e superfici
- 3. processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore**
4. nessuna delle precedenti

15. Per piuria si intende:

1. Urine ematiche
 2. Urine normocromiche
 - 3. Urine con presenza di pus**
 4. Nessuna delle precedenti
16. All'emogasanalisi arteriosa i range di normalità della PaO₂ in un soggetto sano corrispondono a:
1. 24-30 mmHg
 2. 60-120 mmHg
 - 3. 80 -100 mmHg**
 4. 35 -45 mmH
17. La complicanza più frequente della dialisi peritoneale è:
1. L'ipotermia
 - 2. La peritonite**
 3. La stipsi
 4. La ritenzione urinari
18. La scala ADL (Activities of Daily Living) è volta a:
1. valutare lo stato mentale
 2. valutare il rischio di caduta
 - 3. valutare il grado di autonomia nella attività di vita quotidiana**
 4. valutare il rischio sociale
19. Il Decreto Legislativo 81/2008 regola:
- 1. Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro**
 2. Pausa lavorativa
 3. Orario di lavoro
 4. Iscrizione a organizzazione sindacali
20. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità pubblica è sottoscritto da:

1. ARAN (Agenzia rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e Organizzazioni sindacali

2. Presidente della repubblica e Organizzazioni sindacali
3. Presidente del consiglio e Ordini professioni infermieristiche
4. Direttore generale e associazioni

21. Individuare l'affermazione ERRATA riguardante la Cannula Tracheale:

1. Può essere cuffiata e non cuffiata
- 2. Attraverso la cannula tracheale non può essere somministrata ossigenoterapia**
3. Può essere dotata di controcannula
4. Durante l'esecuzione della medicazione occorre prestare attenzione alla cannula, evitando movimenti che potrebbero spostarla

22. Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019 all'art. 33 sancisce che:

1. l'infermiere non è responsabile della redazione della documentazione clinica di competenza
2. l'infermiere è responsabile della conservazione della documentazione clinica di competenza
- 3. l'infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza**
4. nessuna delle precedenti

23. Gli Organi degli Ordini delle Professioni Sanitarie previsti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", sono:

- 1. Presidente, Consiglio Direttivo, Commissione d'Albo, Collegio dei Revisori**
2. Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Sindaco
3. Amministratore delegato, Consiglio dei Sanitari
4. Presidente, Consiglio di Amministrazione

24. Qual è la prima, spesso risolutiva, manovra da eseguire in caso di paziente con ostruzione parziale delle vie aeree?

1. manovra di Valsalva

2. **favorire ed incitare il paziente a tossire**
3. dare da bere a piccoli sorsi
4. eseguire subito l'RCP

25. L'angina pectoris è:

1. una scarsa irrorazione cerebrale e scarsa ossigenazione dovute a cause diverse: anemia, ipotensione, digiuno, temperatura eccessiva, permanenza in ambienti mal areati, traumi fisici e psichici, dolore, fatica prolungata, stazione eretta in soggetti ipotesici
2. una condizione di occlusione degli alveoli polmonari, tale da causare insufficienza respiratoria
3. **una condizione dovuta ad un'alterazione patologica arterio\atero-sclerotica, temporanea costrizione delle arterie coronarie che si manifesta con dolori in sede precordiale di durata relativamente breve**
4. tutte le affermazioni sono corrette

26. Se un paziente riferisce la presenza di aura, si deve pensare che sia prossima l'insorgenza di:

1. attacco di panico
2. depressione
3. **crisi epilettica**
4. dolore retrosternale

27. I "Farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione", secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 7 del Marzo 2008, sono quei farmaci che richiedono particolare attenzione nella gestione ed uso a causa:

1. della potenziale tossicità
2. del basso indice terapeutico
3. dell'alta possibilità di interazione
4. **tutte le precedenti**

28. Un paziente adulto si definisce anurico se la quantità di urine escrete nelle 24 ore è inferiore a:

1. 400-500 ml

2. 1000-1100 ml
- 3. 0-100 ml**
4. 1400-1600 ml

29. Che cos'è il Mini Mental State Examination (MMSE)?

- 1. uno strumento per la valutazione delle alterazioni cognitive**
2. uno strumento per la valutazione della risposta alla terapia anticonvulsivante
3. una scala di valutazione delle complicanze immediate di trauma cranico
4. una scala validata per la valutazione dello stato di stress nei caregiver

30. Il Barthel Index valuta:

- 1. le attività di vita quotidiana**
2. il rischio di cadute
3. i disturbi comportamentali
4. lo stato cognitivo

DOMANDA DI RISERVA

31. Al signor Mario Rossi si deve somministrare Gentamicina 80 mg per via intramuscolare. Si ha a disposizione una fiala di Gentamicina da 80 mg/2 ml, quanti ml devono essere prelevati?

1. 0,5 ml
- 2. 2 ml**
3. 1 ml
4. 4 ml